Lebensqualität nach Kehlkopfteilresektion: Eine Längsschnittstudie

Dissertation

zur Erlangung des akademischen Grades

Dr. med.

an der Medizinischen Fakultät

der Universität Leipzig

Eingereicht von Daniel Clasen, geb. 09.02.1990 in Bonn

Angefertigt an der Universität Leipzig, Abteilung für Medizinische Psychologie und
Medizinische Soziologie

Betreut von Prof. Dr. rer. nat. Andreas Hinz und Dr. rer. med. Judith Keszte,
Universität Leipzig, Abteilung für Medizinische Psychologie und Medizinische
Soziologie

Beschluss über die Verleihung des Doktorgrads vom 20.11.2018

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	3
1.1	Das Larynxkarzinom	3
1.2	Therapiemöglichkeiten des Larynxkarzinoms	4
1.3	Lebensqualität.....	5
1.4	Methodik bei der Evaluierung von Lebensqualität	7
1.5	Lebensqualität bei Krebspatienten	8
1.6	Lebensqualität nach Therapie von Kopf-Hals-Tumoren.....	10
2	Zielstellung der Studie	13
3	Publikation	14
4	Zusammenfassung	37
4.1	Einführung.....	38
4.2	Methoden	39
4.3	Ergebnisse	39
4.4	Diskussion.....	41
5	Literaturverzeichnis.....	44
6	Anlagen	49
6.1	Darstellung des eigenen Beitrags.....	49
6.2	Selbstständigkeitserklärung	50

1 Einführung

1.1 Das Larynxkarzinom

Im Jahr 2014 gab es in Deutschland 3500 erfasste Neuerkrankungen an Kehlkopfkrebs, dabei waren 85% der Erkrankten männlichen Geschlechts. Im gleichen Jahr sind in Deutschland 1525 betroffene Patienten an den Folgen der Erkrankung verstorben.¹ Die höchste Inzidenz zeigt das Larynxkarzinom in der 7. Lebensdekade. Erste Symptome des Larynxkarzinoms sind Dysphonie und Dysphagie. Blutiger Auswurf, Dyspnoe durch Stridor und Beschwerden aufgrund von Metastasen können in fortgeschrittenen Stadien auftreten. Die wichtigsten ätiologischen Risikofaktoren sind Rauchen und Alkoholkonsum. So liegt die Inzidenz unter Rauchern etwa 20-mal höher als unter Nichtrauchern.² Die Wahrscheinlichkeit an einem Larynxkarzinom zu erkranken steigt zudem proportional mit der Menge der gerauchten Zigaretten bzw. des konsumierten Alkohols und potenziert sich bei gleichzeitigem Abusus der beiden Genussmittel.^{2,3} Auch konnte ein niedriger sozioökonomischer Status als unabhängiger Risikofaktor beobachtet werden.⁴ Viele weitere Faktoren, wie zum Beispiel Asbest, positiver HPV-Nachweis, genetische Dispositionen oder hormonelle Einflüsse stehen zusätzlich im Verdacht das Krankheitsrisiko zu erhöhen.

Histologisch handelt es sich bei malignen Tumoren des Larynx fast immer um Plattenepithelkarzinome (>90%). Diese können weiterhin anhand ihrer Lokalisation in (trans-)glottische (etwa 70%), supraglottische (etwa 30%) oder subglottische Karzinome eingeteilt werden.⁵ Dabei ist zu beachten, dass die seltene subglottische Lokalisation oft mit einer längeren asymptomatischen Phase und einer deutlich schlechteren Prognose einhergeht (geschätzte 5-Jahres-Überlebensraten: 40%).⁶

Die Einteilung des Tumorstadiums des Larynxkarzinoms erfolgt anhand der TNM-Klassifikation. Darin inbegriffen sind die 3 Hauptmerkmale T (lokale Tumorausbreitung), N (Lymphknotenbefall) und M (Metastasen), aber auch weitere Faktoren wie z.B. das histologisch gesicherte Grading (Differenziertheit des Tumorgewebes) oder die Zuverlässigkeit der Befundsicherung können miteinfließen. Bei der lokalen Tumorausbreitung werden das Carcinoma in situ (Tis) und die

Stadien T1 (geringe Ausbreitung) bis T4 (maximale Ausbreitung) unterschieden. Um statistische Auswertungen zu erleichtern, werden verschiedene TNM-Klassifikationen in die UICC-Stadien 0-IV (Union Internationale Contre le Cancer) zusammengefasst.

Während Fernmetastasen beim Larynxkarzinom bei Erstuntersuchung selten sind (v.a. Lunge, Knochen, Leber), treten lymphogene Metastasierungen abhängig von der Lokalisation und vor allem in fortgeschrittenen Tumorstadien regelmäßig auf. Da die Glottis fast frei von Lymphgefäßen ist, zeigen frühe Tumorstadien von rein glottischen Larynxkarzinomen jedoch eine geringe (<8%) lymphogene Metastasierung.⁶ Synchrone oder metachrone Karzinome (z.B. Bronchialkarzinome, gastrointestinale Karzinome, Pharynxkarzinome) können in 10-20% der Fälle auftreten.^{5,6} Insgesamt hängt die Prognose des therapierten Larynxkarzinoms hauptsächlich vom Tumorstadium ab: während frühe T1-Stadien 5-Jahres-Überlebensraten von über 90% aufweisen, zeigen bereits ausgedehnte Tumore mit einem T4-Stadium 5-Jahres-Überlebensraten von weniger als 40%.⁶ Dementsprechend kommt der frühzeitigen Diagnose des Larynxkarzinoms eine besondere Bedeutung zu. Neben einer ausführlichen Anamnese (Heiserkeit, Fremdkörpergefühl, Luftnot, Schluckstörungen, Risikofaktoren) werden hierbei insbesondere die Laryngo- und Stroboskopie, sowie bildgebende Verfahren (CT, MRT, Röntgen-Thorax, Sonographie) verwendet. Bei positivem Befund wird zudem eine Panendoskopie zur Abklärung von möglichen Zweittumoren und zur Einschätzung der Tumorausbreitung durchgeführt.

1.2 Therapiemöglichkeiten des Larynxkarzinoms

Therapieansätze bei Kehlkopfkrebs haben sich in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich weiterentwickelt. Nachdem sich die organerhaltende Radiochemotherapie der totalen Laryngektomie bezüglich der Lebensqualität überlegen zeigte,⁷ wurde das Konzept der Organerhaltung mit chirurgischen Ansätzen weiterentwickelt. Heute haben sich Kehlkopfteilresektionen, die mit adjuvanter Radiochemotherapie kombiniert werden können, gerade in frühen Stadien des Larynxkarzinoms als Alternative zur Radiotherapie etabliert.⁸ Sie zeigen eine exzellente lokale Kontrolle, eine niedrige Morbidität und eine funktionelle Kehlkopferhaltung bei geringeren Nebenwirkungen im Vergleich zur

Radiochemotherapie.⁹⁻¹¹ Auch gibt es Ansätze die Kehlkopfteilresektion als Alternative zur totalen Laryngektomie oder Radiochemotherapie in fortgeschrittenen Stadien als Therapieform zu wählen.^{12,13} Die am häufigsten durchgeführten Kehlkopfteilresektionen erfolgen endoskopisch mit einem CO₂-Laser. Das Vorgehen wird als transorale Laser-Mikrochirurgie (TLM) bezeichnet und ist auch bei Chordektomien, bei denen nur eine oder beide Stimmlippen entfernt werden, das Verfahren der Wahl. Die Vorteile der transoralen Laser-Mikrochirurgie (TLM) liegen im Erhalt tumorfreier extra- und intralaryngealer Gewebe durch das Operieren von „innen“, in der blutungsarmen und exakten Präparation durch den CO₂-Laser, sowie in der Möglichkeit das Tumorgewebe in mehreren Blöcken zu reseziieren und damit, ähnlich einer pathologischen Begutachtung, die Infiltrationstiefe des Tumors intraoperativ zu erfassen.

Bei endoskopisch schlecht einsehbaren oder schlecht erreichbaren Tumoren gibt es eine Vielzahl an offenen Vorgehen von außen. Dazu zählen zum Beispiel die frontolaterale Kehlkopfteilresektion nach Le Roux-Robert, die vertikale Hemilaryngektomie nach Hautant oder die horizontale Kehlkopfteilresektion nach Alonso. Bei Verdacht auf lymphogene Metastasierung wird zudem eine ein- oder beidseitige Neck Dissection durchgeführt. Diese kann des Weiteren unterschiedliche Ausprägungen von selektiv bis erweitert radikal annehmen. Bei der Fülle der Therapiemöglichkeiten wird deutlich, dass eine individuelle Therapieentscheidung für jeden Patienten notwendig ist. Diese sollte das Tumorstadium, die Begleiterkrankungen, den Patientenwunsch, sowie - bei chirurgischem Vorgehen - die jeweiligen Kenntnisse des Operateurs berücksichtigen.

1.3 Lebensqualität

Die World Health Organization (WHO) definierte 1948 Gesundheit als „*state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity*“.¹⁴ Bei der Erforschung von Messbarkeit und Messmöglichkeiten von Gesundheit etablierte sich der Begriff der gesundheitsbezogenen Lebensqualität (health-related quality of life). Bis heute gibt es viele unterschiedliche Definitionen von Lebensqualität. Eine der häufigsten Definitionen ist 1993 von der WHO herausgegeben worden:

„Quality of life is defined as an individual's perception of their position in life in the context of the culture and value systems in which they live and in relation to their goals, expectations, standards and concerns. It is a broad ranging concept affected in a complex way by the person's physical health, psychological state, level of independence, social relationships, and their relationship to salient features of their environment“¹⁵

Der hier definierte kulturelle und individuelle Kontext ist leider oftmals zu komplex, als dass ihn heutige, genormte Methoden der empirischen Lebensqualitätsforschung in Gänze miterfassen könnten. Zusammengenommen kann die gesundheitsbezogene Lebensqualität als multidimensionales Konstrukt gesehen werden, das physische, psychische, soziale und funktionale Aspekte einschließt. Dabei steht die subjektive Bewertung durch den individuellen Patienten im Fokus.

Seit 1993 und der damals von der WHO aktualisierten Definition von Lebensqualität hat sich die Anzahl der jährlich herausgegebenen Fachartikel über Lebensqualität bis heute etwa verzehnfacht.¹⁶ Darin spiegelt sich die zunehmend wichtigere Rolle, die Lebensqualität in der heutigen Medizin einnimmt. Bullinger¹⁷ spricht hierbei von einem stattgefundenen Paradigmenwechsel: Während die medizinische Forschung traditionell nur Symptomatik und Überlebenszeit als Evaluationskriterien betrachtet hat, tritt nun die Verbesserung des subjektiven Empfindens in den Vordergrund. Die Implementation von Lebensqualität als wichtiger Outcome-Faktor in Studien kann heutzutage als regelhaft gelten, wenn auch viele Autoren weiterhin lückenhafte Anwendungen beschreiben und eine verbesserte und vermehrte Implementation fordern.^{18–21}

Die Interpretation der erhobenen subjektiven Lebensqualität kann jedoch schwierig sein: Generell-unspezifische Symptome können häufig schlechter verarbeitet werden, als die vom Patienten auf die spezifische Grunderkrankung zurückführbaren Symptome.²² Auch die Erwartungshaltung der Patienten kann Ergebnisse verzerrt erscheinen lassen. Bindewald et al²³ verglichen Patienten mit totaler Kehlkopfresektion und Kehlkopfteilresektion. Dabei gab die Gruppe mit organerhaltender Therapie subjektiv schlechtere Bewertungen der Stimmfunktion an. Objektive Tests zeigten aber eine deutlich bessere Stimmfunktion im Vergleich zur Gruppe der Laryngektomierten. Bei Beachtung dieser psychologischen Faktoren

bietet die erhobene Lebensqualität jedoch nicht nur die Möglichkeit der Bewertung der ursprünglichen Therapie, sondern kann auch anhand der beeinträchtigten Bereiche weitere sich anschließende Therapiemöglichkeiten empfehlen. Darüber hinaus wird die Lebensqualität aus gesundheitsökonomischer und -politischer Sicht genutzt, um Qualität und Kosten einer Therapie zu analysieren und bei Bedarf zu optimieren.²⁴

1.4 Methodik bei der Evaluierung von Lebensqualität

Lebensqualität ist eine Messgröße, die auf Patienteneinschätzungen basiert, sie gehört damit zu den patient-reported outcomes (PROs). Verschiedene Organisationen haben Fragebögen entwickelt und diese hinsichtlich Reliabilität und Validität im jeweiligen nationalen und krankheitsspezifischen Kontext untersucht. Besonders etablierte internationale Fragebögen bei onkologischen Patienten sind der „European Organisation for Research and Treatment of Cancer Quality of Life Questionnaire Core 30“ (EORTC QLQ-C30) und der „Functional Assessment of Cancer Therapy – General“ (FACT-G). Luckett et al²⁵ verglichen beide Fragebögen und empfehlen den EORTC QLQ-C30 bei Mitbetrachtung von Schmerz, Müdigkeit, finanziellen Problemen, gastrointestinalen Einschränkungen, Kurzatmigkeit und sozialen Aktivitäten, den FACT-G bei besonderem Interesse an Partnerschaft und genereller Bewertung der Lebensqualität zu verwenden. Der in unserer Studie genutzte EORTC QLQ-C30 besteht aus 30 Fragen und zielt auf die Erfassung der allgemeinen Lebensqualität. Neben einigen bei Krebspatienten generell häufig anzutreffenden Symptomen (z.B. Fatigue, Übelkeit und Erbrechen) beinhaltet der Fragebogen funktionelle Skalen (z.B. emotionale Funktion, kognitive Funktion), eine Frage nach finanziellen Schwierigkeiten, sowie die globale Lebensqualität der Befragten. Zusätzlich zu dem Kernfragebogen EORTC QLQ-C30 gibt es mittlerweile eine Vielzahl an Zusatzmodulen für spezifische Krebsarten. Das HNO-spezifische Zusatzmodul EORTC QLQ-H&N35 besteht aus 35 Fragen, die sowohl krankheitsspezifische Symptome (z.B. Schluckprobleme, Schmerzen im Mundbereich), wie auch therapiebedingte Lebensqualitätseinbußen (z.B. Sprachprobleme, Tragen einer Ernährungssonde) abdecken.

Den genannten Messinstrumenten ist gemein, dass besondere Vorsicht bei Auswertung der erhobenen Daten geboten ist. So zeigte sich, dass statistisch signifikante und klinisch wahrnehmbare Unterschiede nicht gleichzusetzen sind. Daher wurden Methoden entwickelt, den kleinsten relevanten Unterschied (minimal important difference) zu definieren. Dieser soll den Unterschied abbilden, den der informierte Patient als wichtig wahrnimmt und ihn oder seinen betreuenden Therapeuten zu einer Therapieänderung leiten könnte.²⁶ Anhand des kleinsten relevanten Unterschiedes lassen sich dann kleine, mittlere und große klinisch relevante Unterschiede definieren. Zwei unterschiedliche Ansätze versuchen dies zu ermöglichen: Ankerbasierte Methoden (anchor-based methods) setzen zusätzliche Erhebungsdaten voraus, die als Referenz dienen. Ein Beispielfrage wäre „Hat sich die Therapie für Sie gelohnt?“. Anhand der gegebenen Antwort können dann andere Erhebungsdaten relativiert werden. Verteilungsbasierte Methoden (distribution-based methods) beruhen auf einer rein statistisch-mathematischen Grundlage. Standardabweichung, Standardmessfehler und die von der Standardabweichung abhängige Effektstärke sind häufige Techniken die zur Beurteilung des kleinsten relevanten Unterschieds benutzt werden. Bisher hat sich keine der Möglichkeiten als Goldstandard etablieren können. Eine oft genutzte Methode zur Beurteilung von klinischen Unterschieden von PROs ist die Einstufung anhand absoluter Differenzen der Mittelwerte. Mit einer Kombination aus anker- und verteilungsbasierter Methoden zeigte eine Studie von Osoba et al²⁷, dass ein Unterschied ≥ 10 Punkten auf einer Skala des EORTC QLQ C-30 als klinisch relevant eingeschätzt werden kann. Eine noch genauere Interpretation von klinisch relevanten Unterschieden versprechen neue Ansätze, die für die einzelnen Untergruppen der Lebensqualitätsfragebögen individuelle Punktedifferenzen errechnen.²⁸ Da es leider noch keine allgemeingültige Definition der klinischen Relevanz für Patienten mit Kopf-Hals-Tumoren gibt, ist grundsätzlich eine vorsichtige Interpretation der Veränderungen der Lebensqualität für diese Patientengruppe sinnvoll.

1.5 Lebensqualität bei Krebspatienten

Die naheliegende Annahme, dass eine Krebserkrankung zu einer eingeschränkten Lebensqualität führt, wurde wissenschaftlich bestätigt. Die Prävalenz einer

ausgeprägten psychosozialen Beeinträchtigung oder behandlungsbedürftigen psychischen Störung liegt in der Gruppe der Krebspatienten bei etwa 30% und damit deutlich höher als im deutschen Bevölkerungsschnitt ($\approx 20\%$).^{29,30} Auch bei Patienten, die eine Krebstherapie bereits überlebt haben, kann im Vergleich eine eingeschränkte physische und psychische Lebensqualität beobachtet werden.³¹

Die Ursachen für die eingeschränkte Lebensqualität beginnen bereits mit der Diagnosestellung der Krebserkrankung. Diese allein bedingt in einem großen Teil der Patienten (35-38%) eine psychosoziale Belastung und kann im Verlauf zu unterschiedlichen psychischen Störungen, wie z.B. einer Depression oder Angststörung, führen.^{32,33} Zu beachten gilt, dass verschiedene Krebsarten und deren spezifischen Therapieformen unterschiedliche Auswirkungen auf die physische und mentale Gesundheit haben können. Während Patienten mit Mammakarzinom, Prostatakarzinom oder einem Melanom oft eine zum Bevölkerungsschnitt nicht signifikant veränderte Lebensqualität aufweisen, können sehr deutliche Einschränkungen bei Patienten mit Lungenkarzinom, hämatologischen Krebserkrankungen oder auch Kopf-Hals-Tumoren beobachtet werden.^{31,32} Weitere Faktoren, wie z.B. das Geschlecht, Alter oder der soziale Status der Patienten können zudem eine entscheidende Rolle in Qualität und Schweregrad der Lebensqualitätseinschränkung spielen.³²

Verschiedene psychoonkologische Verfahren wurden entwickelt, um die Lebensqualität der Krebspatienten zu verbessern. Dabei konnte gezeigt werden, dass Verfahren wie die kognitive Verhaltenstherapie (als Einzel-, Gruppen- oder Paar-Therapie), die Psychoedukation oder Entspannungstherapien eine emotionale Belastung, Ängstlichkeit oder Depression deutlich lindern und die Lebensqualität signifikant verbessern können.³⁴ Psychoonkologische Therapien, die über einen längeren Zeitraum durchgeführt werden, weisen einen prolongiert anhaltenden Therapieerfolg nach Abschluss der Therapie auf.³⁴ Auch die Physiotherapie als supportives Verfahren kann zu deutlichen Lebensqualitätsverbesserungen führen. So zeigten sich bei Krebspatienten nach einer begleitenden Physiotherapie funktionelle Verbesserungen, eine stärkere Muskelkraft, erhöhte physische Aktivitätslevel, signifikante Verbesserungen in den Bereichen Fatigue und Ängstlichkeit, sowie ein erhöhtes Selbstwertgefühl.³⁵ Da die psychischen und physischen

Lebensqualitätseinbußen bei Krebspatienten von einer sehr hohen Anzahl von Faktoren (Alter, Geschlecht, sozialer Status, Krebsart, Tumorstadium, Vorerkrankungen, Standard der Gesundheitsversorgung...) abhängig sind und dementsprechend sehr unterschiedlich ausfallen können, besteht ein sehr großer Forschungsbedarf, um eine möglichst individuelle Therapieplanung zu ermöglichen.

1.6 Lebensqualität nach Therapie von Kopf-Hals-Tumoren

Das Ziel heutiger onkologischer Behandlungen ist nicht nur die Verlängerung der Lebenszeit, sondern auch die Erhaltung oder Gewinnung von Lebensqualität. Lokalisationen von Kopf-Hals-Tumoren betreffen wichtige funktionelle Bereiche des Körpers. Die jeweiligen Organe ermöglichen u.a. Atmung, Ernährung, Stimme, Geschmack und Geruch. Einschränkungen dieser physischen Funktionen sind im Besonderen mit sozialen und psychologischen Problematiken verknüpft. Kopf-Hals-Tumore betreffen zudem einen von außen besonders gut einsehbaren Bereich. Ein verändertes Körperbild durch operative Maßnahmen kann dementsprechend leicht zu Scham- und verminderten Selbstwertgefühlen führen. Damit haben dort lokalisierte Einschränkungen einen vergleichbar hohen negativen Einfluss auf viele Bereiche der Lebensqualität.

Grundsätzlich zeigte sich, dass ein beeinträchtigter sozioökonomischer Status einen unabhängigen Risikofaktor für HNO-Krebs darstellt.⁴ Da sozioökonomischer Status und Lebensqualität signifikant miteinander verbunden sind³⁶, ist anzunehmen, dass an Kehlkopfkrebs Erkrankte häufig schon bereits im Vorfeld Einschränkungen ihrer Lebensqualität erfahren haben. Weitere Beeinträchtigungen der Lebensqualität können also auch daher besonders deutliche Auswirkungen auf diese Patienten haben.

Organerhaltende Therapieansätze zielen neben verbesserter objektiver Stimm- und Schluckfunktion vor allem auf Erhalt und Verbesserung der vom Patienten wahrgenommenen Lebensqualität. Gesundheitsbezogene Lebensqualität als patient-reported outcome (PRO) hat sich so zu einem Hauptfaktor in der Bewertung von Therapien von Kopf-Hals-Tumoren entwickelt. Bisher publizierte Studienergebnisse der Lebensqualitätsforschung nach Therapie von Kopf-Hals-Tumoren zeigten, dass die größten Änderungen der Lebensqualität grundsätzlich im

ersten Jahr nach der stattgefundenen Therapie auftraten.³⁷ Nach deutlichen Einbußen direkt im Anschluss an die jeweilige Therapie, erreichten die meisten Bereiche der Lebensqualität nach einem Jahr wieder präinterventionelle Werte. Zwischen Erhebungen nach einem Jahr und solchen nach drei Jahren, konnten nur wenige Verbesserungen beobachtet werden.³⁷ Im Allgemeinen wurde gezeigt, dass zusätzliche Therapiemodalitäten die Lebensqualität negativ beeinflussen. Dies wurde für die Gruppe der Patienten mit Kehlkopfteilresektion für adjuvante Radiotherapie, Neck Dissection und Anlage einer Magensonde zur künstlichen Ernährung nachgewiesen.^{38–41} Auch in einer Studie von Smith et al⁴² konnte beobachtet werden, dass Patienten ohne jedwede zusätzliche Therapie die beste Lebensqualität aufwiesen. Weiterhin konnte beobachtet werden, dass die Bewertung der präoperativen Lebensqualität mit Tumorstadium und Tumorlokalisation korreliert.³⁸

Prospektive, longitudinale Studien der Lebensqualität nach Kehlkopfteilresektionen sind selten durchgeführt worden. Eine dieser wenigen Studien untersuchte die Lebensqualität von 93 Patienten vor und 12 Monate nach Kehlkopfteilresektion durch transorale Laser-Mikrochirurgie. Die ein Jahr nach der Operation erhobenen Daten zeigten gute Ergebnisse der generellen Lebensqualität und Verbesserungen in der Untergruppierung Schmerz, sowie Verbesserung in den Bereichen Stimmung und Ängstlichkeit.³⁸ Eine deutlich eingeschränkte Lebensqualität zeigte sich in einer Studie von Veldhuis et al⁴³, die 35 Patienten mit Kehlkopfteilresektion oder Laryngektomie untersuchte. Zehn Monate nach der jeweiligen Operation waren 18 von 33 Lebensqualitätsskalen statistisch signifikant verschlechtert. Die Erkrankung eines Großteils der Patienten war jedoch in einem fortgeschrittenen Tumorstadium und wurde mit einer Laryngektomie therapiert (60%), ein Umstand der die vergleichsweise schlechte Lebensqualität begründen könnte. Johansson et al⁴⁴ untersuchten die Lebensqualität von 100 Patienten mit vorwiegend frühen Stadien des Larynxkarzinoms nach primärer Radiotherapie. In dieser longitudinalen Studie zeigte sich eine kontinuierliche Verbesserung der globalen Lebensqualität bis ein Jahr nach der Intervention. Im Vergleich zu präinterventionellen Werten zeigten sich nach 12 Monaten eine verbesserte emotionale Funktion, eine verbesserte Stimmfunktion, aber vermehrt Probleme mit zähem Schleim. Hierbei muss beachtet werden, dass zwar ähnliche Studienpopulationen in Bezug auf die Krankheitsentität, jedoch deutliche Unterschiede aufgrund der Therapieart möglich sind. Aufgrund der

bisherigen spärlichen Datenlage besteht ein deutlicher Bedarf an weiterer Forschung, um die Lebensqualität nach einer Kehlkopfteilresektion bewerten zu können.

2 Zielstellung der Studie

Die organerhaltenden Kehlkopfteilresektionen dienen der Erhaltung von Sprache, Geruch, Geschmack und Schluckfunktion bei vollständiger Resektion des Kehlkopfkrebsses. Damit stehen viele wichtige Aspekte der Lebensqualität im Fokus, wenn man den Erfolg dieser Therapien bewerten möchte. Bei Betrachtung der wenigen bisher veröffentlichten Studienergebnisse kann jedoch keine Aussage getroffen werden, ob die Lebensqualität den Erwartungen von Therapeuten und Patienten entspricht. Dadurch ergaben sich folgende Fragestellungen für die durchgeführte Studie:

Gibt es Bereiche in denen Patienten ein Jahr nach ihrer Kehlkopfteilresektion eine im Vergleich zu präoperativen Werten verbesserte Lebensqualität aufweisen? Wenn ja, in welchen Bereichen trifft dies zu?

Welche Einschränkungen der Lebensqualität können bei Patienten im zeitlichen Verlauf des ersten Jahres nach einer Kehlkopfteilresektion beobachtet werden?

Sind HNO-spezifische Einschränkungen der Lebensqualität oder allgemein psychosoziale Einschränkungen stärker ausgeprägt?

3 Publikation

Titel: Quality of life during the first year after partial laryngectomy: Longitudinal study

Autoren: Daniel Clasen, Judith Keszte, Andreas Dietz, Jens Oeken, Eberhard F. Meister, Orlando Guntinas-Lichius, Friedemann Pabst, Jens Büntzel, Eva-Maria Jenzowski, Susanne Singer, Alexandra Meyer

Zeitschrift: Head & Neck, Wiley, ISI Journal Citation Reports Ranking 2016: 1/42 (Otorhinolaryngology), Impact-Faktor: 3,376

Veröffentlichung: Akzeptiert am 10.01.2018, „Early View“-Veröffentlichung im Februar 2018, Journal-Veröffentlichung im Juni 2018 (Volume 40, Issue 6, Pages 1185-1195)

DOI: 10.1002/hed.25095

This is the peer reviewed version of the following article: „Quality of life during the first year after partial laryngectomy: Longitudinal study“, which has been published in final form at <https://doi.org/10.1002/hed.25095> . This article may be used for non-commercial purposes in accordance with Wiley Terms and Conditions for Use of Self-Archived Versions.

Quality of life during the first year after partial laryngectomy: A longitudinal study

Daniel Clasen, MSc,¹ Judith Keszte, MSc,¹ Andreas Dietz, MD,² Jens Oeken, MD,³ Eberhard F. Meister, MD,⁴ Orlando Guntinas-Lichius, MD,⁵ Friedemann Pabst, MD,⁶ Jens Büntzel, MD,⁷ Eva-Maria Jenzowski, MD,⁸ Susanne Singer, PhD,⁹ and Alexandra Meyer, PhD¹

- (1) *University Hospital Leipzig, Department of Medical Psychology and Medical Sociology, Division Psychosocial Oncology, Leipzig, Germany*
- (2) *University Hospital Leipzig, Department of Otorhinolaryngology, Leipzig, Germany*
- (3) *Clinical Center Chemnitz, Department of Otorhinolaryngology, Chemnitz, Germany*
- (4) *Clinical Center St. Georg, Department of Otorhinolaryngology, Leipzig, Germany*
- (5) *Jena University Hospital, Department of Otorhinolaryngology, Jena, Germany*
- (6) *Clinical Center Dresden–Friedrichstadt, Department of Otorhinolaryngology, Dresden, Germany*
- (7) *Clinical Center Südharz Nordhausen, Department of Otorhinolaryngology, Nordhausen, Germany*
- (8) *Clinical Center Carl Thiem Cottbus, Department of Otorhinolaryngology, Cottbus, Germany*
- (9) *University Medical Centre Mainz, Institute of Medical Biostatistics, Epidemiology and Informatics (IMBEI), Mainz, Germany*

Financial funding:

Funded by grants from the German Cancer Aid (#107440, #109604).

Abstract

Background

This prospective study was conducted to assess changes in quality of life (QoL) of patients who undergo a partial laryngectomy (PLE).

Methods

The European Organization for Research and Treatment of Cancer questionnaires QLQ-C30 and QLQ-H&N35 were used pre-procedure (n=218), one week (n=159), three months (n=122) and one year after PLE (n=88). Changes over time were analyzed with the Wilcoxon-signed-rank-test and the Holm-Bonferroni-method, and interpreted regarding clinical relevance.

Results

Most subscales worsened one week post-procedure, but many recovered to baseline level after one year. Dyspnea and cognitive functioning deteriorated over time, with worst scores recorded after one year. Financial difficulties and fatigue increased after surgery and maintained that level throughout the follow-up period; sticky saliva remained worse than at baseline, despite some improvements over time.

Conclusions

The discovered limitations of QoL should be observed more closely during follow-up treatment, and patients should be informed about these potential effects before PLE.

Introduction

Management of local and locally advanced laryngeal cancer has evolved extensively over the past years.¹ To preserve the larynx, non-surgical treatments were the first choice,² but then the focus has turned to partial laryngectomy (PLE), a procedure which offers excellent local control rates, low morbidity and functional larynx preservation with fewer adverse effects.^{3–5} Nowadays this comparatively small intervention seems to be a promising alternative both to primary radiotherapy (RT) for patients with early stage tumors⁶ and total laryngectomy (TLE) or radiochemotherapy for patients with more advanced tumors.^{7,8} In addition to vertical partial laryngectomy and supraglottic laryngectomy, approaches such as transoral laser microsurgery (TLM) and supracricoid partial laryngectomy present an increased variety of treatment options made even more diverse when combined with adjuvant radiochemotherapy.

Previous research has revealed that the largest quality of life (QoL) changes laryngeal cancer patients experience are observed within the first year after surgery, and that significant deterioration occurs just after treatment completion.⁹ As far as longer term effects are concerned, only few improvements have been seen to occur between the one- and three-year follow-up examinations.¹⁰

To our knowledge only two longitudinal studies have reported QoL in the first year after PLE.^{11,12} One study by Vilaseca et al¹¹ investigated 93 patients' QoL before and 12 months after TLM using the UW-QoL and the SF-12 questionnaire. These patients showed a good global QoL with improved mood, pain and anxiety scores one year later. Generally worse outcomes were found by Veldhuis et al¹² who used the EORTC QLQ-C30 and QLQ-H&N35 to assess QoL of 35 patients which were treated with TLE or PLE. They found that 18 out of 33 QoL scales were statistically significant impaired 10 months after surgery. However, most of these patients were at more advanced stages of the disease and had undergone a TLE (60%), a fact which might explain the comparatively worse outcomes.

Other studies, which examined head and neck cancer patients' QoL, found that additional treatment modalities such as adjuvant RT^{11,13,14}, neck dissection^{11,15}, and feeding tube

placement^{14,15} were associated with poorer QoL. Due to the lack of longitudinal data, more research is needed to clarify which relevant QoL changes patients and therapists can expect post PLE.

While QoL has become one of the major outcome factors for assessing head and neck cancer treatment success, statistically significant changes in QoL do not always imply actual clinically recognizable differences. Furthermore, it is important to keep in mind that group-level changes can be statistically significant but trivial in magnitude if the group sample size is large enough. Hence, anchor- or distribution-based methods can be helpful in determining the clinical relevance of QoL data.¹⁶ New approaches offer differential guidelines for interpreting separate domain scores instead of providing the same guidelines for all domain scores of the QoL questionnaires, thus providing more exact assessments of clinical relevance.¹⁷ Unfortunately, definitions of clinically relevant QoL changes that pertain specifically to head and neck cancer are still lacking and need to be further researched.

The aim of this large prospective study was to assess the trajectory of QoL among patients who have undergone a PLE, and to track clinically relevant changes over the course of the first year after surgery.

Materials and Methods

Design

In a multi-center prospective study with consecutive patient enrollment, data was collected between 2007 and 2015 at fifteen hospitals in Germany (University Medical Centers Leipzig, Jena and Halle, Clinical Centers Sankt Georg Leipzig, Dresden-Friedrichstadt, Chemnitz, Stollberg, Südharz Nordhausen, Elbland Riesa, Martha Maria Halle Dölau, Helios Erfurt, Carl Thiem Cottbus, Wald Gera, Bavaria Kreischau and Sonnenberg Bad Sooden Allendorf). In these hospitals, all adult patients (18 years or older) with a full command of the German language who were diagnosed with laryngeal or hypopharyngeal cancer or carcinoma in situ, and who were planning on undergoing a PLE were invited to participate. Each participating

hospital informed the study centre in Leipzig when a PLE was scheduled, whereupon a member of the study team went to the clinic and met with the patient on site. The interviewer explained the purpose of the study and invited patients to participate. Each patient was informed about the data protection rights, content, design, and aims of the study and was given a written consent form. Ethical approval was obtained from the Leipzig University Ethics Committee. The participants were interviewed before treatment (T1), one week after PLE (T2), three months after PLE or upon completion of rehabilitation treatment (T3) and one year after PLE (T4). Patients were contacted by mail or telephone at each time-point and asked for their consent to be interviewed again. At all four measurement points, a structured face-to-face interview (mainly due to an additional component to the study which will be reported in another manuscript) was conducted in the patient's home or in the hospital. Subsequently, patients completed the self-administered questionnaires independently.

Instruments

Sociodemographic data were collected via structured interviews at T1. These data were obtained according to the standards of the German Pension Insurance Association, which were created so that sociodemographic data could easily be compared between German studies in the area of rehabilitation sciences.¹⁸ Medical data were drawn from the patients' medical records one week after their procedure.

Quality of life was evaluated with the core questionnaire QLQ-C30¹⁹ and the head and neck module QLQ-H&N35²⁰ from the European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC) at each measurement point. The EORTC QLQ-C30 is an instrument developed specifically for assessing cancer patients' general QoL. The questionnaire consists of 30 questions that form 5 functional scales (physical, role, cognitive, emotional, social), 3 multiple-item symptom scales (pain, fatigue, nausea and vomiting), 6 single-item scales (insomnia, constipation, diarrhea, dyspnea, appetite loss, financial difficulties), and a global QoL scale. Questions are answered on Likert-scales and transformed into standardized scores ranging from 0 to 100. Higher scores on functional scales and on the global QoL scale

represent better QoL, whereas higher scores on symptom scales represent more impaired QoL.

The QLQ-H&N35 is a module designed specifically for measuring the symptoms of head and neck cancer, its treatment, and its treatment-related side effects. Thirty-five questions generate 7 multiple-item scales (pain, swallowing, sensory problems, speech problems, impaired sexuality, trouble with social eating, and social contact), and 11 single-item scales (teeth, opening mouth, dry mouth, sticky saliva, coughing, feeling ill, pain killers, nutritional supplements, feeding tube, weight loss, and weight gain). Questions are answered on Likert-scales and transformed into standardized scores ranging from 0 to 100. In all scales of the QLQ-H&N35, high scores represent highly impaired QoL.

We used the German versions of these instruments, which are widely used and have demonstrated evidence of good reliability and validity.²⁰⁻²³ Moreover, both questionnaires have been validated in patients treated with PLE.^{24,25}

Statistical analysis

We only included patients who participated at baseline in our analysis. Patients who enrolled at later time-points were treated as non-participants. If patients missed a measurement point they were excluded from further analysis at later measurement points. EORTC scores for both questionnaires were calculated in accordance with the EORTC guidelines.²⁶ To assess the clinical relevance of the QoL changes over time, EORTC QLQ-C30 scores were interpreted using evidence-based guidelines from Cocks et al¹⁷. These guidelines are based on samples of mixed cancer patients, expert opinions and meta-analysis, and they focus on distinguishing between the different subscales. A clinically relevant “medium” change in global QoL, for example, is defined by a 10-15 points difference, while role functioning has to show 19-29 points difference to be interpreted the same way. The subscale emotional functioning was excluded from interpretation due to the lack of reference values in the Cocks et al guidelines¹⁷. As no such data exists for interpreting the EORTC QLQ-H&N35, we followed Osoba et al¹⁶ and determined a score difference of 10-19

points to be a clinically relevant “medium” change, and a ≥ 20 points difference to be a “large” change. Because Cocks et al¹⁷ have shown that differences between the two procedures can be pronounced, we decided to increase the validity of our results and did not include “small” changes in QoL for either the EORTC QLQ-C30 or the QLQ-H&N35. In order to facilitate the utility and implementation of our results in clinical practice, we decided to use a heat map: Mean differences between baseline and each time-point were compiled and clinically relevant medium and large differences were marked with different gray levels, enabling both health professionals and patients to quickly detect changes over time.

A non-responder and drop-out analysis was performed using Pearson’s chi-square and Fisher’s exact test, to assess the risk of selection bias. We used the Mann-Whitney U test to evaluate differences in baseline QoL between completers and patients who dropped out during the study. Differences between pairs of measurement points were tested with the Wilcoxon signed-rank test. Generally, an alpha level of 0.05 was considered statistically significant. Due to multiple testing, the alpha levels for the comparisons of QoL over time were adjusted using the Holm–Bonferroni method. All data analyses were conducted using SPSS (Version 22.0) statistical software.²⁷

Results

Response rate, non-responder and drop-out analyses

Four hundred and thirty-two patients met the inclusion criteria. Two patients died before the first potential interview and two patients could not be contacted at all. Eighty-three patients (19%) refused to participate at all and had various reasons for doing so including: low motivation (25%), distress due to cancer or cancer therapy (17%), time related (4%), or unspecified (54%).

Of the remaining 345 eligible patients, 127 patients were enrolled after T1. Two hundred and eighteen patients provided QoL data at baseline and were included in further analysis.

One hundred and thirty patients dropped out during the course of the study (T2/T3/T4) either because of death (n=0/2/6), subsequent TLE (n=1/1/5), no availability (n=9/6/2),

incomplete data (n=26/15/11), or active decline (n=23/13/10). Reasons for active decline during the study were: low motivation (14%), strain (7%), time related (3%) or unspecified (76%). Ultimately, 159 participants (for differences between T1 and T2), 122 participants (T1-T3) and 88 completers (T1-T4, T3-T4) were included in the analysis of changes over time (at T3, 65 participants were interviewed 3 months after PLE and 57 participants were interviewed after completing rehabilitation, but there was no significant difference in the follow-up interval between these two subgroups).

No statistically significant differences were found between participants and non-participants (including the excluded patients due to missing QoL data at baseline), regarding age, sex, tumor stage, operation, and tumor site. The same was true when comparing completers and patients who dropped out during the course of the study. For these two latter groups, an additional analysis found no statistically significant differences in education ($p=.59$), but did reveal a statistically significant difference in adjuvant therapy ($p<.01$). While patients who were treated with adjuvant radiotherapy dropped out more often during the study, completers were less likely to have received additional treatment. A similar distribution was found among patients receiving adjuvant chemotherapy or radiochemotherapy. No statistically significant differences were found for baseline values of any the EORTC QLQ-C30 or EORTC QLQ-H&N35 subdomains between completers and patients who dropped out during the course of the study (data not shown). However, weight loss at baseline tended to be a more serious issue in drop-outs ($p=.06$). More detailed information is displayed in Table 1.

Sample characteristics

The sample consisted of 205 male and 13 female patients with a mean age of 62.8 years (range= 40-86 years, SD= 10.4). Among this group 80% were diagnosed with early-stage disease (classification according to the Union for International Cancer Control (UICC) 0-II). Most of the patients (63%) were treated with TLM, and the next largest group by laser chordectomy (27%). Open surgery was performed in 10% of the cases. Tumor sites and

additional clinical and sociodemographic characteristics of the sample are displayed in Table 1 and Table 2.

Changes in Quality of Life over time

Upon visual inspection, the mean scores of all the subscales showed numerical deteriorations one week after surgery (Table 3). After that, physical functioning, cognitive functioning and dyspnea deteriorated further, their worst scores being recorded at one year post-procedure, but the majority of the subscales gradually improved over time. Despite the positive general trend over time, after one year, 26 out of 33 domains tended to show a numerically deterioration compared to baseline.

Between T1 and T2, the largest statistically significant and clinically relevant changes in QoL scores over time, as demonstrated on the heat map (Table 4), were observed. With the exception of 4 domains (global QoL, emotional functioning, problems with teeth and appetite loss), all EORTC QLQ-C30 and QLQ-H&N35 subscales showed statistically significant deteriorations one week after treatment. Clinically relevant medium and large changes were seen in 16 of 33 domains at that time (Table 4).

Comparing T1 and T3, of the 12 head and neck specific subscales, which showed clinically relevant deteriorations between T1 and T2, 3 domains continued to show clinically worse scores at T3: sexuality (+12.0 points, $p<.01$), sticky saliva (+14.8 points, $p<.01$) and feeling ill (+16.1 points, $p<.01$). Two scales, senses (+12.7 points, $p<.01$) and dry mouth (+10.4 points, $p<.01$), showed a single clinically relevant peak of deterioration at T3 relative to T1. EORTC QLQ-C30 scores showed more constant deteriorations over this period. Four of 15 subscales remained worse at T3 compared to baseline (social functioning, fatigue, pain, financial difficulties), while dyspnea (+12.6 points, $p<.01$) progressively deteriorated at T3 compared to baseline.

Between T3 and T4, both questionnaires reflected statistically but not clinically significant changes in the following areas: improvement in speech (-8.2 points, $p<.01$) and deterioration in dyspnea (+5.3 points, $p=.05$).

A comparison between T1 and T4, showed that 6 of 33 QLQ-30 and H&N35 subscales showed clinically relevant changes in QoL over the course of one year post-procedure including a large improvement in weight gain (+25.0 points, $p<.01$) and a large deterioration in dyspnea (+17.8 points, $p<.01$). Medium deteriorations were observed in cognitive functioning (-10.4 points, $p<.01$), fatigue (+15.0 points, $p<.01$), financial difficulties (+21.2 points, $p<.01$) and sticky saliva (+11.2 points, $p=.01$). Except for weight gain, no clinically or statistically significant improvements were seen one year after surgery compared to baseline. Although there was a slight deterioration between T1 and T2 (-4.7 points, $p=.02$), the mean global QoL remained largely unaffected with no clinically or statistically significant change over time.

Discussion

Only a few longitudinal studies with data on QoL among head and neck cancer patients who have undergone a PLE have been published so far. Often, patients with comparable stages of laryngeal or hypopharyngeal cancer had either undergone a PLE but were only a small subgroup of a larger sample, or they had received primary radiochemotherapy or RT but had not been operated on. For this reason, comparisons of our results with those of other investigations have to be made carefully. Our data offer information regarding changes in QoL during the first year after PLE. In interpreting our results, we focused on moderate-to-large clinically relevant findings.

While the more specific EORTC QLQ-H&N35 indicated that patients experienced an overall postoperative recovery, the more general EORTC QLQ-C30 indicated that either no recovery or even deterioration over time took place in some domains. One year after PLE, the EORTC QLQ-H&N35 revealed the domain sticky saliva to be the only clinically relevant impairment

remaining compared to baseline. However, the continuous positive trend could suggest a further improvement after our observed time span. In contrast to this slow improvement over time, all other head and neck specific subscales recovered to baseline level, many of them as soon as 3 months after PLE. Improvements between 3 months and one year post-procedure were small and no clinically relevant change was seen in this period.

Our results from the more general EORTC QLQ-C30 revealed some interesting developments. Dyspnea and cognitive functioning deteriorated over time and with the worst scores being recorded at the last measurement point, while financial difficulties and fatigue worsened in the acute post-operative period and maintained the same level of deterioration through the one-year follow-up period. Dyspnea in particular seemed to become a serious problem in that time span, showing a clinically relevant large change between baseline and one year after PLE. Comparable data were found in the larynx subgroup (n=35) of a study by Veldhuis et al¹² with patients who had had a PLE or TLE and experienced similar clinically relevant deteriorations in these four subscales 10 months after surgery. Using the EORTC QLQ-C30 and QLQ-H&N35, Veldhuis et al¹² reported generally poorer outcomes one year post-procedure in the laryngeal cancer subgroup compared with the scores from our sample at the same time point. However, most of the laryngeal cancer patients in the Veldhuis et al study¹² were at more advanced stages of the disease and had undergone a TLE (60%), a fact which might explain the comparatively worse outcomes they reported. In contrast to the results of our study, other studies with patients treated with partial laryngectomy¹³ or RT²⁸ did not report a significant worsening of dyspnea.

The item-scale dyspnea consists of the question “Were you short of breath?” which is very general and unspecific, making it difficult to speculate about explanations for the high scores we saw. One possible factor that might have contributed to dyspnea and fatigue could be that our patients stopped participating in sports and physically demanding tasks, lost their physical capacity and endurance, and did not return to these activities after treatment. Statistically significant impaired scores in physical functioning and increased dyspnea over

time may support this assumption. Physical therapy follow-up treatment as well as encouraging patients to find their way back into an active life could help to reduce these detriments of their QoL.

Vilaseca et al¹¹ examined 93 patients' QoL using the UW-QOL and the SF-12 questionnaire before and one year after TLM. They found no significant deterioration after one year except for those indicated by the SF-12 vitality score. Patients with early and advanced glottic and advanced supraglottic tumors showed significant postoperative improvements in mood, pain, and anxiety. Significant improvements in patients with early supraglottic tumors were found for the domains pain and swallowing. While speech improved in the early glottic tumors patient group, scores of patients with supraglottic or advanced glottic tumors remained unchanged or showed a non-significant tendency to worsening. Based on these results, Vilaseca et al¹¹ concluded that their patients had a very good QoL one year after undergoing TLM. Our data seem consistent with these improvements only in so far as corresponding areas in our questionnaires (pain, pain in the mouth, emotional functioning, speech, swallowing) showed no clinically relevant deterioration after one year.

Another longitudinal study conducted by Johansson et al²⁸ analyzed the QoL of 100 patients with mostly early stages of larynx cancer who were treated with RT only. Similar findings using the EORTC QLQ-H&N35 indicated only 2 statistically and clinically significant changes after one year of recovery time: sticky saliva did not recover to baseline level, while speech was the only area that improved. As speech showed no comparable statistically significant change in our data, we cannot directly confirm these results. Nevertheless, we did observe a slight, non-significant tendency toward improvement in this area. Another clear difference appears in the sexuality domain, which was not affected in the Johansson et al²⁸ study. The worsened scores in our data might be a result of the more invasive nature of the procedure. However, Singer et al²⁹ analyzed 206 patients treated with PLE or TLE and found that different treatment modalities were unrelated to sexual problems, whereas psychological distress had the strongest association with reduced libido and sexual enjoyment after

laryngeal and hypopharyngeal cancer treatment. Johansson et al²⁸ noted worsened fatigue scores in the first 3 months and then a return to baseline 6 months after treatment. While global QoL and emotional functioning improved over time in that study, cognitive functioning remained at the baseline level. Distinct differences can be seen in our impaired scores of fatigue and cognitive functioning. As these two subscales tended to be worse with additional RT in previous studies^{11,13,14,30}, a correlation could be presumed. However, an initial overview of the subscales fatigue, cognitive functioning and dyspnea from patients treated without any adjuvant treatment in our study revealed that scores were comparable to scores of the overall group.

One of the main problems mentioned by the patients in our study was financial difficulties. As social security and financial conditions depend strongly on national and regional circumstances, it should be noted that another study from Singer et al³¹, which was performed in the same hospitals but with patients treated with TLE, revealed comparable clinically relevant deteriorations in financial difficulties. Socioeconomic context seems to be an independent risk factor for head and neck cancer.³² In our experience, low incomes and negligible to non-existent financial reserves are common among head and neck cancer patients and could be a reason why reduced earnings after diagnosis may affect this group even more severely. Because socioeconomic status is significantly linked to QoL and is a prognostic factor for morbidity and mortality in head and neck cancer patients³³, their financial and professional circumstances should be observed more closely and they should be provided with information about possible financial support during hospitalization. A general inclusion of social workers into therapy teams could help to achieve these aims.

Because weight loss and weight gain are interrelated, it might be assumed that the large changes seen in our data can be reduced to the fact that our patients suffered weight loss during the week after surgery. This might be due to the circumstances of artificial nutrition inherent to the operation procedure.

We found that 26 out of 33 domains were numerically worse one year later compared to baseline values. Even if most of the differences were not clinically relevant, one could presume that our patients would indicate an impaired global QoL. Nevertheless, the subscale global QoL showed no statistically significant deterioration over time. An explanation for this could be that even when multiple aspects of QoL deteriorate, patients may tend to maintain a generally positive view of their life.

Existing research has suggested that patients who receive PLE go on to experience good QoL¹¹, but our longitudinal data revealed that some significant impairments to QoL do persist even after one year of recovery time. Patients' expectations play a major role in the assessment of QoL after surgery.³⁴ It has already been discussed in other studies that this is also true for patients who undergo a PLE^{35,36}, but future research is needed to clarify the correlation between preoperative expectations and QoL after PLEs. The presumed small treatment procedure and, in most of the cases, the fact that patients are at an early stage of their cancer disease could lead to over-optimistic expectations. We recommend informing patients carefully about potential lasting impairments in advance, as this might make it easier for them to cope with them if and when they occur. Furthermore, we recommend that health care providers actively ask about potential deterioration of QoL (in particular: dyspnea, fatigue, financial difficulties) during follow-up examinations, encourage patients to find their way back into an active life, offer physical therapy treatment options, include social workers into therapy teams, and provide information about possible financial support.

Limitations of the study

One clear limitation of the study was the high attrition rate. However, statistical analysis revealed only one difference in adjuvant therapy between those who completed the survey and those who dropped out, while no differences were found between participants and non-participants. Another limitation is the heterogeneity of the patient groups included in this analysis. This can lead to difficulties in making statements about rare subgroups, for example about patients with subglottic cancer. The exploratory and descriptive nature of the analyses and the high refusal rate are further limitations of this study. The study focused only on

moderate-to-large clinically relevant differences, which may have obscured small clinically relevant changes. As a result of the collaboration across 15 German treatment centers, a particular strength of the study is the large size of the patient cohort included, especially considering how few studies have thus far investigated the QoL of patients who have undergone PLEs.

Conclusion

Patients who have had a PLE have the same QoL in many areas one year later as they did before the operation. Head and neck specific areas showed faster recovery than general domains, and, with one exception (sticky saliva), were not moderate-to-large impaired to a clinically relevant degree one year later. Some areas of general QoL (dyspnea, financial difficulties, fatigue, cognitive functioning) remained worse or deteriorated further. The discovered impact of such procedures on QoL should be observed more closely during follow-up treatment, and patients should be informed about these potential effects before undergoing the operation. Future research is needed to confirm our findings and should include a focus on how patients' expectations correlate with their QoL after undergoing a PLE.

Conflict of interest statement

The authors declare that they have no conflict of interest.

Tables

TABLE 1. Drop-out characteristics comparing participants with non-participants as well as completer with drop-out

Variable	Participants	Non-Participants	p	Completer	Drop-Out*	p
No. of patients	218	214		88	130	
Age						
≤ 63 years	109	90		43	66	
> 63 years	109	102	.53	45	64	.78
No information	0	22		0	0	
Sex						
Male	205	193		84	121	
Female	13	21	.14	4	9	.46
UICC						
O	8	17		3	5	
I	112	100		49	63	
II	54	46	.34	23	31	.53
III	17	16		4	13	
IV	27	30		9	18	
No information	0	5		0	0	
Tumor site						
Glottis	140	130		62	79	
Supraglottis	32	22		11	21	
Subglottis	4	3	.30	1	3	.58
Overlapping lesion of larynx	26	27		10	16	
Hypopharynx	11	21		4	8	
Unspecified	5	11		0	3	
Operation						
TLM	137	116		53	84	
Laser chordectomy	58	60	.66	25	33	.75
Open laryngeal resection	22	21		10	12	
Unspecified PLE	1	17		0	1	
Adjuvant therapy						
Only surgery	158	†		71	87	
Radiotherapy	40	†	†	7	33	
Chemotherapy	1	†		1	0	<.01
Radiochemotherapy	19	†		9	10	

Abbreviations: TLM, transoral laser microsurgery; PLE, partial laryngectomy

Notes: p-Values were calculated with Pearson's chi-square or Fisher's exact test.

*Participants who dropped out during the course of the study

† data could not be sufficiently collected

TABLE 2. Patient characteristics (n=218)

Variable	No. of patients	%
Age		
40-49	25	11.5
50-59	55	25.2
60-69	75	34.4
70-79	55	25.2
80-89	8	3.7
Neck dissection		
No	125	57.3
Yes	91	41.7
No information	2	.9
Rehabilitation treatment		
No	85	39.0
Yes	76	34.9
No information	57	26.1
Education		
Less than 10 years	104	47.7
10 years	80	36.7
More than 10 years	34	15.6
Employment		
Employed	67	30.7
Unemployed	28	12.8
Retirement	123	56.4
Household net income per month		
<1500 Euro	72	33.0
1500-3000 Euro	80	36.7
>3000 Euro	29	13.3
No information	37	17.0

TABLE 3. Quality of life during the first year after partial laryngectomy

Variable	T1	T2	T3	T4
No. of patients	218	159	122	88
EORTC QLQ-C30				
Physical functioning	86.5 (17.7)	79.1 (19.5)	78.7 (20.3)	77.2 (21.0)
Role functioning	84.4 (28.5)	68.7 (30.7)	73.2 (27.4)	71.6 (31.3)
Emotional functioning	71.8 (26.3)	68.7 (24.4)	71.3 (24.1)	74.3 (24.9)
Cognitive functioning	91.7 (15.3)	84.3 (19.5)	84.7 (20.5)	82.6 (21.4)
Social functioning	88.1 (22.7)	75.9 (25.8)	76.6 (27.5)	81.4 (23.9)
Global QL	59.7 (19.5)	55.6 (20.9)	63.6 (18.4)	61.0 (20.7)
Fatigue	16.3 (22.4)	31.5 (26.1)	30.7 (26.4)	30.5 (25.4)
Nausea and vomiting	1.1 (5.7)	4.8 (13.2)	5.1 (16.2)	2.5 (6.9)
Pain	12.4 (22.5)	29.4 (28.0)	24.6 (27.9)	23.2 (26.0)
Dyspnea	13.7 (27.6)	19.4 (28.5)	24.9 (29.6)	28.0 (30.3)
Insomnia	25.5 (36.7)	31.0 (34.0)	25.1 (31.6)	23.1 (28.7)
Appetite loss	9.0 (24.7)	11.8 (22.7)	15.6 (27.5)	10.2 (21.7)
Constipation	2.1 (13.0)	12.6 (25.9)	8.2 (19.8)	4.5 (14.5)
Diarrhea	2.9 (12.6)	8.0 (20.0)	6.8 (16.0)	7.2 (14.7)
Financial difficulties	8.0 (22.6)	27.4 (32.9)	28.4 (33.8)	26.1 (33.7)
EORTC QLQ-H&N35				
Pain in the mouth	9.3 (16.1)	23.1 (24.0)	13.8 (19.6)	9.1 (15.4)
Swallowing	7.9 (17.9)	26.0 (30.7)	14.2 (23.5)	9.2 (17.3)
Senses	3.1 (10.8)	11.9 (20.5)	16.5 (25.8)	11.9 (21.6)
Speech	39.3 (27.0)	58.6 (28.5)	43.0 (28.2)	33.0 (26.2)
Social eating	4.7 (12.1)	17.5 (25.6)	11.7 (23.3)	5.5 (12.8)
Social contact	4.6 (10.6)	11.9 (17.4)	10.0 (15.9)	6.3 (11.2)
Sexuality	20.0 (34.0)	32.9 (35.5)	33.3 (36.5)	30.9 (33.7)
Problems with teeth	9.5 (26.4)	14.9 (27.2)	14.2 (25.1)	12.9 (20.5)
Problems opening mouth	5.2 (17.9)	14.6 (27.8)	9.3 (22.0)	8.8 (21.2)
Dry mouth	17.1 (29.4)	27.0 (28.7)	29.8 (32.6)	28.4 (33.0)
Sticky saliva	11.3 (24.2)	31.0 (33.7)	26.0 (32.5)	21.8 (29.1)
Coughing	33.0 (35.5)	46.9 (32.0)	39.1 (31.1)	34.8 (27.6)
Feeling ill	15.0 (26.0)	36.9 (29.6)	28.4 (26.1)	18.8 (26.8)
Painkillers	16.1 (36.8)	45.6 (50.0)	24.6 (43.2)	17.0 (37.8)
Nutritional supplements	4.1 (19.9)	15.4 (36.2)	9.8 (29.9)	5.7 (23.3)
Feeding tube	.5 (6.8)	19.2 (39.5)	6.6 (25.0)	3.4 (18.3)
Weight loss	19.7 (39.9)	35.3 (47.9)	20.5 (40.5)	12.5 (33.3)
Weight gain	6.4 (24.6)	14.2 (35.0)	26.7 (44.4)	31.8 (46.8)

Notes: Data are shown with mean scores and standard deviation in brackets. Data were collected before surgery (T1), one week (T2), three months (T3) and one year after surgery (T4).

TABLE 4. Heat map with mean differences over time

Variable	T1-T2	T1-T3	T1-T4
No. of patients	159	122	88
EORTC QLQ-C30			
Physical functioning	-7.8 (<.01)	-8.7 (<.01)	-9.3 (<.01)
Role functioning	-15.9 (<.01)	-11.9 (<.01)	-12.4 (<.01)
Emotional functioning*	-4.5 (.02)	-2.5 (.26)	-0.9 (.91)
Cognitive functioning	-7.2 (<.01)	-7.8 (<.01)	-10.4 (<.01)
Social functioning	-12.2 (<.01)	-12.5 (<.01)	-8.6 (<.01)
Global QL	-4.7 (.02)	2.2 (.16)	-0.9 (.76)
Fatigue	15.5 (<.01)	14.7 (<.01)	15.0 (<.01)
Nausea and vomiting	3.7 (<.01)	3.6 (.04)	1.3 (.04)
Pain	17.3 (<.01)	14.3 (<.01)	12.0 (<.01)
Dyspnea	7.4 (.01)	12.6 (<.01)	17.8 (<.01)
Insomnia	7.8 (.01)	3.6 (.22)	0.8 (.85)
Appetite loss	3.6 (.12)	7.4 (<.01)	3.0 (.28)
Constipation	10.5 (<.01)	6.8 (<.01)	3.0 (.01)
Diarrhea	4.8 (<.01)	3.0 (.14)	1.9 (.41)
Financial difficulties	20.7 (<.01)	22.9 (<.01)	21.2 (<.01)
EORTC QLQ-H&N35			
Pain in the mouth	13.6 (<.01)	4.9 (.01)	1.0 (.86)
Swallowing	18.6 (<.01)	6.7 (<.01)	2.1 (.20)
Senses	8.7 (<.01)	12.7 (<.01)	9.6 (<.01)
Speech	20.3 (<.01)	4.2 (.18)	-6.1 (.15)
Social eating	12.8 (<.01)	7.7 (<.01)	2.2 (.17)
Social contact	7.8 (<.01)	6.1 (<.01)	2.6 (.03)
Sexuality	10.6 (<.01)	12.0 (<.01)	7.8 (.05)
Problems with teeth	4.6 (.18)	4.9 (.10)	4.9 (.07)
Problems opening mouth	8.7 (<.01)	4.6 (.04)	6.5 (.01)
Dry mouth	7.7 (.01)	10.4 (<.01)	8.7 (.06)
Sticky saliva	18.9 (<.01)	14.8 (<.01)	11.2 (.01)
Coughing	14.2 (<.01)	8.7 (.01)	4.2 (.27)
Feeling ill	23.7 (<.01)	16.1 (<.01)	7.4 (.05)
Painkillers	28.6 (<.01)	9.8 (.04)	3.4 (.65)
Nutritional supplements	11.0 (<.01)	4.9 (.21)	1.1 (1)
Feeding tube	18.6 (<.01)	5.8 (.04)	2.3 (.63)
Weight loss	20.2 (<.01)	4.9 (.36)	-1.1 (1)
Weight gain	7.9 (.02)	20.1 (<.01)	25.0 (<.01)

Notes: Data are shown with mean differences between time points and p-Values (Wilcoxon signed-rank test) in brackets. Bold numbers indicate a statistically significant change after

the Holm–Bonferroni method. Values marked with bright red indicate a medium clinically meaningful change, values marked with dark red indicate a large clinically meaningful change. Except for weight loss and weight gain, which can be interpreted two ways, all changes are impairments. Data were collected before surgery (T1), one week (T2), three months (T3) and one year after surgery (T4).

*Excluded from interpretation due to the lack of reference values in the guidelines from Cocks et al¹⁷.

References

1. Argiris A, Karamouzis MV, Raben D, Ferris RL. Head and neck cancer. *Lancet* 2008;371:1695–1709.
2. Terrell JE, Fisher SG, Wolf GT, Vet Affairs Laryngeal Canc Study Grp. Long-term quality of life after treatment of laryngeal cancer. *Arch Otolaryngol Head Neck Surg* 1998;124:964–971.
3. Caicedo-Granados E, Beswick DM, Christopoulos A, et al. Oncologic and functional outcomes of partial laryngeal surgery for intermediate-stage laryngeal cancer. *Otolaryngol Head Neck Surg* 2013;148:235–242.
4. Canis M, Martin A, Ihler F, et al. Transoral laser microsurgery in treatment of pT2 and pT3 glottic laryngeal squamous cell carcinoma - results of 391 patients. *Head Neck* 2014;36:859–866.
5. Machtay M, Moughan J, Trotti A, et al. Factors associated with severe late toxicity after concurrent chemoradiation for locally advanced head and neck cancer: an RTOG analysis. *J Clin Oncol* 2008;26:3582–3589.
6. van Gogh, Christine D L, Verdonck-de Leeuw, Irma M, Wedler-Peeters J, Langendijk JA, Mahieu HF. Prospective evaluation of voice outcome during the first two years in male patients treated by radiotherapy or laser surgery for T1a glottic carcinoma. *Eur Arch Otorhinolaryngol* 2012;269:1647–1652.
7. Canis M, Ihler F, Martin A, Wolff HA, Matthias C, Steiner W. Organ preservation in T4a laryngeal cancer: is transoral laser microsurgery an option? *Eur Arch Otorhinolaryngol* 2013;270:2719–2727.
8. Tomeh C, Holsinger FC. Laryngeal cancer. *Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg* 2014;22:147–153.
9. Hammerlid E, Mercke C, Sullivan M, Westin T. A prospective quality of life study of patients with laryngeal carcinoma by tumor stage and different radiation therapy schedules. *Laryngoscope* 1998;108:747–759.

10. Hammerlid E, Silander E, Hörnestam L, Sullivan M. Health-related quality of life three years after diagnosis of head and neck cancer--a longitudinal study. *Head Neck* 2001;23:113–125.
11. Vilaseca I, Ballesteros F, Martínez-Vidal BM, Lehrer E, Bernal-Sprekelsen M, Blanch JL. Quality of life after transoral laser microresection of laryngeal cancer: a longitudinal study. *J Surg Oncol* 2013;108:52–56.
12. Veldhuis D, Probst G, Marek A, et al. Tumor site and disease stage as predictors of quality of life in head and neck cancer: A prospective study on patients treated with surgery or combined therapy with surgery and radiotherapy or radiochemotherapy. *Eur Arch Otorhinolaryngol* 2016;273:215–224.
13. Olthoff A, Steuer-Vogt MK, Licht K, Sauer-Goenen M, Werner C, Ambrosch P. Quality of life after treatment for laryngeal carcinomas. *ORL J Otorhinolaryngol Relat Spec* 2006;68:253–258.
14. Ronis DL, Duffy SA, Fowler KE, Khan MJ, Terrell JE. Changes in quality of life over 1 year in patients with head and neck cancer. *Arch Otolaryngol Head Neck Surg* 2008;134:241–248.
15. Terrell JE, Ronis DL, Fowler KE, et al. Clinical predictors of quality of life in patients with head and neck cancer. *Arch Otolaryngol Head Neck Surg* 2004;130:401–408.
16. Osoba D, Rodrigues G, Myles J, Zee B, Pater J. Interpreting the significance of changes in health-related quality-of-life scores. *J Clin Oncol* 1998;16:139–144.
17. Cocks K, King MT, Velikova G, Martyn St-James M, Fayers PM, Brown JM. Evidence-based guidelines for determination of sample size and interpretation of the European Organisation for the Research and Treatment of Cancer Quality of Life Questionnaire Core 30. *J Clin Oncol* 2011;29:89–96.
18. Verband deutscher Rentenversicherungsträger. Förderschwerpunkt „Rehabilitationswissenschaften“. Empfehlungen der Arbeitsgruppen „Generische Methoden“, „Routinedaten“ und „Reha-Ökonomie“. Frankfurt am Main: VDR; 1999.
19. Aaronson NK, Ahmedzai S, Bergman B, et al. The European Organization for Research and Treatment of Cancer QLQ-C30: A Quality-of-Life Instrument for Use in International Clinical Trials in Oncology. *JNCI Journal of the National Cancer Institute* 1993;85:365–376.
20. Bjordal K, Graeff A de, Fayers PM, et al. A 12 country field study of the EORTC QLQ-C30 (version 3.0) and the head and neck cancer specific module (EORTC QLQ-H&N35) in head and neck patients. EORTC Quality of Life Group. *Eur J Cancer* 2000;36:1796–1807.
21. Kanatas AN, Mehanna HM, Lowe D, Rogers SN. A second national survey of health-related quality of life questionnaires in head and neck oncology. *Ann R Coll Surg Engl* 2009;91:420–425.

22. Sherman AC, Simonton S, Adams DC, Vural E, Owens B, Hanna E. Assessing quality of life in patients with head and neck cancer: cross-validation of the European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC) Quality of Life Head and Neck module (QLQ-H&N35). *Arch Otolaryngol Head Neck Surg* 2000;126:459–467.
23. Groenvold M, Klee MC, Sprangers MA, Aaronson NK. Validation of the EORTC QLQ-C30 quality of life questionnaire through combined qualitative and quantitative assessment of patient-observer agreement. *J Clin Epidemiol* 1997;50:441–450.
24. Singer S, Wollbrück D, Wulke C, et al. Validation of the EORTC QLQ-C30 and EORTC QLQ-H&N35 in patients with laryngeal cancer after surgery. *Head Neck* 2009;31:64–76.
25. Bjordal K, Hammerlid E, Ahlner-Elmqvist M, et al. Quality of life in head and neck cancer patients: validation of the European Organization for Research and Treatment of Cancer Quality of Life Questionnaire-H&N35. *J Clin Oncol* 1999;17:1008–1019.
26. Fayers PM, Aaronson NK, Bjordal K, Groenvold M, Curran D, Bottomley A, on behalf of the EORTC Quality of Life Group. EORTC QLQ-C30 Scoring Manual (3rd edition) 2001.
27. IBM Corp. Released 2013. IBM SPSS Statistics for Windows, Version 22.0. Armonk, NY: IBM Corp.
28. Johansson M, Rydén A, Finizia C. Self evaluation of communication experiences after laryngeal cancer - a longitudinal questionnaire study in patients with laryngeal cancer. *BMC Cancer* 2008;8:80.
29. Singer S, Danker H, Dietz A, et al. Sexual problems after total or partial laryngectomy. *Laryngoscope* 2008;118:2218–2224.
30. Smith JC, Johnson JT, Cognetti DM, et al. Quality of life, functional outcome, and costs of early glottic cancer. *Laryngoscope* 2003;113:68–76.
31. Singer S, Danker H, Guntinas-Lichius O, et al. Quality of life before and after total laryngectomy: results of a multicenter prospective cohort study. *Head Neck* 2014;36:359–368.
32. Conway DI, McKinney PA, McMahon AD, et al. Socioeconomic factors associated with risk of upper aerodigestive tract cancer in Europe. *Eur J Cancer* 2010;46:588–598.
33. Babin E, Sigston E, Hitier M, Dehesdin D, Marie JP, Choussy O. Quality of life in head and neck cancers patients: predictive factors, functional and psychosocial outcome. *Eur Arch Otorhinolaryngol* 2008;265:265–270.

34. Pusic AL, Klassen AF, Snell L, et al. Measuring and managing patient expectations for breast reconstruction: impact on quality of life and patient satisfaction. *Expert Rev Pharmacoecon Outcomes Res* 2012;12:149–158.
35. Bindewald J, Herrmann E, Dietz A, et al. Lebensqualität und Sprachverständlichkeit bei Patienten mit Kehlkopfkarcinom--Relevanz des "Zufriedenheitsparadoxes". *Laryngorhinootologie* 2007;86:426–430.
36. Seiferlein E, Haderlein T, Schuster M, Gräbel E, Bohr C. Correlation between coping strategies and subjective assessment of the voice-related quality of life of patients after resection of T1 and T2 laryngeal tumours. *Eur Arch Otorhinolaryngol* 2012;269:2091–2096.

4 Zusammenfassung

Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades

Dr. med.

Lebensqualität nach Kehlkopfteilresektion: Eine Längsschnittstudie

Eingereicht von Daniel Clasen, geb. 09.02.1990 in Bonn

Angefertigt an der Universität Leipzig, Abteilung für Medizinische Psychologie und Medizinische Soziologie

Betreut von Prof. Dr. rer. nat. Andreas Hinz und Dr. rer. med. Judith Keszte, Universität Leipzig, Abteilung für Medizinische Psychologie und Medizinische Soziologie

Einreichung im April 2018

4.1 Einführung

Die Behandlung von Patienten mit Kehlkopfkrebs hat in den letzten Jahrzehnten deutliche Änderungen erfahren. Die Kehlkopfteilresektion als organerhaltendes Verfahren wurde dabei stetig weiterentwickelt und steht heute bei vielen unterschiedlichen Tumorlokalisationen und -stadien als Therapieoption mit oder ohne adjuvanter Therapie zur Verfügung. Die postoperative Lebensqualität nach einer Kehlkopfteilresektion wurde dagegen bisher kaum erforscht. Die wenigen bereits veröffentlichten Studien haben zudem sehr unterschiedliche Ergebnisse gezeigt.

Diese große prospektive Studie hat sich zum Ziel gesetzt, die Lebensqualität von Patienten im ersten Jahr nach einer Kehlkopfteilresektion zu untersuchen.

4.2 Methoden

Für diese prospektive multizentrische Studie wurden zwischen 2007 und 2015 Daten an 15 deutschen Kliniken gesammelt. In diesem Zeitraum wurden alle erwachsenen und deutschsprachigen Patienten zur Studienteilnahme eingeladen, bei denen aufgrund eines diagnostizierten Larynx- oder Hypopharynx-Karzinoms eine Kehlkopfteilresektion geplant wurde. Die Teilnehmer wurden vor der OP (T1), eine Woche danach (T2), 3 Monate danach oder nach Abschluss ihrer Reha (T3), sowie ein Jahr nach der Kehlkopfteilresektion persönlich befragt und erhielten zusätzlich schriftliche Fragebögen, die sie selbstständig ausfüllten. Die Lebensqualität wurde mithilfe der beiden von der European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC) entwickelten Fragebögen QLQ-C30 und H&N35 erfasst. Zur Interpretation der klinischen Relevanz der Werte wurden zwei verschiedene Ansätze verfolgt. Für Skalen des QLQ-C30 nutzten wir skalenspezifische evidenzbasierte Guidelines von Cocks et al (2011). Da ähnliche Guidelines für den QLQ-H&N35 noch nicht entwickelt wurden, zogen wir Ergebnisse von Osoba et al (1998) heran, die skalenübergreifend einen „mittleren“ Unterschied als Punktdifferenz von 10-19 Punkten und einen „großen“ Unterschied mit ≥ 20 Punkten definieren. Die statistische Signifikanz der Unterschiede zwischen zwei Zeitpunkten wurde mit dem Wilcoxon-Vorzeichen-Rang-Test getestet. Ein Signifikanzniveau von 0,05 wurde generell als statistisch signifikant angesehen. Aufgrund multipler Tests wurde das Signifikanzniveau jedoch mit der Bonferroni-Methode korrigiert.

4.3 Ergebnisse

Die Einschlusskriterien für die Studie wurden von 432 potenziellen Teilnehmern erfüllt. Für die vorliegende Analyse standen davon 218 Patienten zur Verfügung. Im Verlauf der Studie kam es zu einem Dropout von 130 Patienten. Schlussendlich konnten Datensätze von 159 Patienten für Veränderungen zwischen T1-T2, von 122

Patienten für die Veränderungen zwischen T1-T3, und von 88 Patienten für Veränderungen zwischen T1-T4 und T3-T4 ausgewertet werden. Zwischen Teilnehmern (n=218) und Nicht-Teilnehmern (n=214) gab es in keinem der untersuchten Bereiche (Alter, Geschlecht, Tumorstadium, Tumorlokalisation und Operationsmethode) einen statistisch signifikanten Unterschied. Zwischen Teilnehmern, die bis zum letzten Befragungszeitpunkt vollständig teilnahmen (n=88) und den Studienabbrechern (n=130) zeigte sich, dass letztere statistisch signifikant häufiger eine adjuvante Radiotherapie erhielten, während die Gruppe der „Completer“ häufiger keine weitere zusätzliche Therapie erhielten ($p<.01$). Die untersuchte Stichprobe bestand aus 205 Männern und 13 Frauen mit einem mittleren Alter von 62,8 Jahren. Ein bereits fortgeschrittenes Tumorstadium mit einer UICC-Klassifikation von III oder IV hatten 20% der Patienten. Die meisten Patienten (63%) erhielten transorale Laser-Mikrochirurgie (TLM), Chordektomien wurden bei 27% der Patienten durchgeführt, während offene Verfahren bei 10% der Patienten gewählt wurden. Die häufigsten Tumorlokalisationen waren glottisch (n=140), supraglottisch (n=32) und überlappende Ausbreitungen am Larynx (n=26). Während 158 Patienten keine adjuvante Therapie erhielten, wurde bei 40 Patienten eine adjuvante Radiotherapie, bei einem Patienten eine adjuvante Chemotherapie und bei 19 Patienten eine adjuvante Radiochemotherapie durchgeführt.

Ergebnisse der Lebensqualität im Zeitverlauf:

T1-T2 Die größte Änderung der Lebensqualität ist eine Woche nach der Operation zu erkennen. Bis auf 4 Skalen (globale Lebensqualität, emotionales Funktionsniveau, Probleme mit den Zähnen und Appetitlosigkeit) sind alle Skalen, im Vergleich zu präoperativen Werten, statistisch signifikant verschlechtert. Klinisch relevante „mittlere“ und „große“ Unterschiede zeigen sich in 12 von 18 Skalen des QLQ-H&N35, sowie in 4 von 15 Skalen des QLQ-C30.

T1-T3 Bei Vergleich der Werte nach 3 Monaten mit den präoperativen Werten im QLQ-H&N35 zeigt sich, dass nur 3 von den 12 bereits zu T2 verschlechterten Skalen weiterhin klinisch relevant verschlechtert sind: Sexualität beeinträchtigt (+12.0 Punkte, $p<.01$), klebriger Speichel (+14.8 Punkte, $p<.01$) und Krankheitsgefühl

(+16.1 Punkte, $p < .01$). Zwei Skalen lassen einzelne klinisch relevante Verschlechterungen zu T3 erkennen: Sinne beeinträchtigt (+12.7 Punkte, $p < .01$) und trockener Mund (+10.4 Punkte, $p < .01$). Die Ergebnisse des QLQ-C30 deuten auf deutlich konstantere Einbußen der Lebensqualität in diesem Zeitraum hin. Die 4 bereits zu T2 verschlechterten Skalen (soziales Funktionsniveau, Fatigue, Schmerz, finanzielle Schwierigkeiten) bleiben zu T3, im Vergleich zu den Baseline-Werten, weiterhin klinisch relevant verschlechtert. Zudem zeigt sich eine mit der Zeit progressive Verschlechterung der Skala Kurzatmigkeit (+12.6 Punkte, $p < .01$).

T1-T4 Ein Jahr nach der Operation zeigen 6 von 33 untersuchten Skalen klinisch relevante Unterschiede im Vergleich zu den präoperativen Werten. Während eine „große“ klinisch relevante Verschlechterung in Kurzatmigkeit (+17.8 Punkte, $p < .01$) zu beobachten ist, zeigen sich „mittlere“ klinisch relevante Lebensqualitätseinbußen in den Skalen kognitives Funktionsniveau (-10.4 Punkte, $p < .01$), Fatigue (+15.0 Punkte, $p < .01$), finanzielle Schwierigkeiten (+21.2 Punkte, $p < .01$) und klebriger Speichel (+11.2 Punkte, $p = .01$).

4.4 Diskussion

Während unsere Ergebnisse des HNO-spezifischen EORTC QLQ-H&N35 eine umfassende Erholung der Lebensqualität nahelegen, deutet der allgemein gehaltene EORTC QLQ-C30 auf bleibende Lebensqualitätseinbußen sowie -verschlechterungen im ersten postoperativen Jahr hin. So zeigten die Skalen Kurzatmigkeit und kognitives Funktionsniveau eine progressive Verschlechterung und ihre schlechtesten Werte ein Jahr nach dem Eingriff. Auch die sich in der ersten Woche postoperativ verschlechterten Bereiche finanzielle Schwierigkeiten und Fatigue blieben auf diesem Niveau bis zum Ende des Untersuchungszeitraums.

Eine ähnliche Zunahme der Kurzatmigkeit zeigte sich in der Larynx-Gruppe ($n=35$) einer Studie von Veldhuis et al (2016), die mit den gleichen EORTC-Fragebögen die Lebensqualität 10 Monate nach Kehlkopfteilresektion oder Laryngektomie untersucht hat. Da jedoch der Großteil der untersuchten Patienten in einem späteren Tumorstadium und/oder mit einer Laryngektomie (60%) therapiert wurden, ist die

Vergleichbarkeit eingeschränkt. Die Skala Kurzatmigkeit besteht aus der Frage „Waren Sie kurzatmig?“, welche sehr generell gehalten ist und es schwierig macht eine Erklärung für die gefundene Lebensqualitätseinschränkung zu finden. Ein möglicher Faktor, der die Kurzatmigkeit und Fatigue unserer Patienten beeinflusst haben könnte, wäre, dass diese Sport und körperlich anspruchsvolle Tätigkeiten im Alltag postoperativ pausiert, jedoch im Anschluss nicht wiederaufgenommen haben. Statistisch signifikante Verschlechterungen im physischen Funktionsniveau und die über Zeit ansteigende Kurzatmigkeit könnten diese These stützen.

Ein wichtiges Problem unserer Patienten waren finanzielle Schwierigkeiten. Da soziale und finanzielle Verhältnisse stark von nationalen und regionalen Unterschieden beeinflusst werden, sollte erwähnt werden, dass eine Studie von Singer et al (2014), die in den selben Krankenhäusern die Lebensqualität nach Laryngektomie untersucht hat, vergleichbare finanzielle Schwierigkeiten auftraten. Ein niedriger sozioökonomischer Status scheint ein unabhängiger Risikofaktor für HNO-Tumore zu sein (Conway et al, 2010). Nach unseren Erfahrungen sind niedrige Einkommen und nichtexistierende finanzielle Rücklagen häufig anzutreffen in dieser Patientengruppe. Dies könnte ein Grund sein, warum finanzielle Einbußen diese Gruppe noch stärker als gewöhnlich in ihrer Lebensqualität einschränken.

Verglichen mit anderen Studien, welche die Lebensqualität nach Kehlkopfteilresektion (Vilaseca et al, 2013) und Radiotherapie (Johansson et al, 2008) im Jahresverlauf untersucht haben, zeigen sich bei uns deutlich höhere Einschränkungen der Lebensqualität. Dabei gilt es zu beachten, dass die Erwartungen der Patienten eine große Rolle in der Bewertung ihrer Lebensqualität nach einer Operation einnehmen. Ob dieser Zusammenhang auch für Patienten stimmt, die eine Kehlkopfteilresektion erhalten, wurde bereits in anderen Studien diskutiert, jedoch ist zukünftige Forschungsarbeit notwendig um die Korrelation zwischen präoperativen Erwartungen und der Lebensqualität nach Kehlkopfteilresektion sicher zu bewerten. Der von Patienten vermutete kleine Eingriff und das häufige frühe Tumorstadium könnten zu optimistische Erwartungen bedingen. Wir empfehlen eine ausführliche präoperative Aufklärung der Patienten

über mögliche Lebensqualitätseinschränkungen, da dies Patienten ermöglicht besser mit diesen Einbußen im Anschluss umzugehen. Weiterhin empfehlen wir gründliche Nachsorgeuntersuchungen, Patienten zu motivieren in ihren physisch aktiven Alltag zurückzukehren, physiotherapeutische Angebote anzubieten, Sozialarbeiter in die Therapieteams mit einzubinden, sowie auf mögliche finanzielle Unterstützung hinzuweisen.

5 Literaturverzeichnis

1. Zentrum für Krebsregisterdaten im Robert Koch-Institut, www.krebsdaten.de/abfrage (Zugriff am 23.01.2018).
2. Talamini R, Bosetti C, La Vecchia C, et al. Combined effect of tobacco and alcohol on laryngeal cancer risk: a case-control study. *Cancer Causes Control* 2002;13:957–964.
3. Menvielle G, Luce D, Goldberg P, Bugel I, Leclerc A. Smoking, alcohol drinking and cancer risk for various sites of the larynx and hypopharynx. A case-control study in France. *Eur J Cancer Prev* 2004;13:165–172.
4. Conway DI, McKinney PA, McMahon AD, et al. Socioeconomic factors associated with risk of upper aerodigestive tract cancer in Europe. *Eur J Cancer* 2010;46:588–598.
5. Arnold W, Ganzer U. Checkliste Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde: 25 Tabellen. 4th ed. Stuttgart, New York: Thieme; 2005.
6. Reiß M. Facharztwissen HNO-Heilkunde: Differenzierte Diagnostik und Therapie. Heidelberg: Springer; 2009.
7. Terrell JE, Fisher SG, Wolf GT, Vet Affairs Laryngeal Canc Study Grp. Long-term quality of life after treatment of laryngeal cancer. *Arch Otolaryngol Head Neck Surg* 1998;124:964–971.
8. van Gogh, Christine D L, Verdonck-de Leeuw, Irma M, Wedler-Peeters J, Langendijk JA, Mahieu HF. Prospective evaluation of voice outcome during the first two years in male patients treated by radiotherapy or laser surgery for T1a glottic carcinoma. *Eur Arch Otorhinolaryngol* 2012;269:1647–1652.
9. Caicedo-Granados E, Beswick DM, Christopoulos A, et al. Oncologic and functional outcomes of partial laryngeal surgery for intermediate-stage laryngeal cancer. *Otolaryngol Head Neck Surg* 2013;148:235–242.
10. Canis M, Martin A, Ihler F, et al. Transoral laser microsurgery in treatment of pT2 and pT3 glottic laryngeal squamous cell carcinoma - results of 391 patients. *Head Neck* 2014;36:859–866.

11. Machtay M, Moughan J, Trotti A, et al. Factors associated with severe late toxicity after concurrent chemoradiation for locally advanced head and neck cancer: an RTOG analysis. *J Clin Oncol* 2008;26:3582–3589.
12. Canis M, Ihler F, Martin A, Wolff HA, Matthias C, Steiner W. Organ preservation in T4a laryngeal cancer: is transoral laser microsurgery an option? *Eur Arch Otorhinolaryngol* 2013;270:2719–2727.
13. Tomeh C, Holsinger FC. Laryngeal cancer. *Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg* 2014;22:147–153.
14. Preamble to the Constitution of the World Health Organization as adopted by the International Health Conference, New York, 19-22 June, 1946; signed on 22 July 1946 by the representatives of 61 States (Official Records of the World Health Organization, no. 2, p. 100) and entered into force on 7 April 1948.
15. Study protocol for the World Health Organization project to develop a Quality of Life assessment instrument (WHOQOL). *Qual Life Res* 1993;2:153–159.
16. Suche in der Literaturlatenbank PubMed nach "quality of life". <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=%22quality+of+life%22> (Zugriff am 27.03.2018).
17. Bullinger M. Gesundheitsbezogene Lebensqualität und subjektive Gesundheit. Überblick über den Stand der Forschung zu einem neuen Evaluationskriterium in der Medizin. *Psychother Psychosom Med Psychol* 1997;47:76–91.
18. Efficace F, Feuerstein M, Fayers P, et al. Patient-reported outcomes in randomised controlled trials of prostate cancer: methodological quality and impact on clinical decision making. *Eur Urol* 2014;66:416–427.
19. Wilson MK, Friedlander ML, Joly F, Oza AM. A Systematic Review of Health-Related Quality of Life Reporting in Ovarian Cancer Phase III Clinical Trials: Room to Improve. *Oncologist* 2018;23:203–213.
20. Greenhalgh J. The applications of PROs in clinical practice: what are they, do they work, and why? *Qual Life Res* 2009;18:115–123.
21. Kanatas AN, Mehanna HM, Lowe D, Rogers SN. A second national survey of health-related quality of life questionnaires in head and neck oncology. *Ann R Coll Surg Engl* 2009;91:420–425.

22. Fahsl S, Keszte J, Boehm A, et al. Clinical relevance of quality-of-life data in laryngectomized patients. *Laryngoscope* 2012;122:1532–1538.
23. Bindewald J, Herrmann E, Dietz A, et al. Lebensqualität und Sprachverständlichkeit bei Patienten mit Kehlkopfkarzinom--Relevanz des "Zufriedenheitsparadoxes". *Laryngorhinootologie* 2007;86:426–430.
24. Nikitovic M, Brener S. Health technologies for the improvement of chronic disease management: a review of the Medical Advisory Secretariat evidence-based analyses between 2006 and 2011. *Ont Health Technol Assess Ser* 2013;13:1–87.
25. Lockett T, King MT, Butow PN, et al. Choosing between the EORTC QLQ-C30 and FACT-G for measuring health-related quality of life in cancer clinical research: issues, evidence and recommendations. *Ann Onco* 2011;22:2179–2190.
26. Schünemann HJ, Puhan M, Goldstein R, Jaeschke R, Guyatt GH. Measurement Properties and Interpretability of the Chronic Respiratory Disease Questionnaire (CRQ). *Int J Chron Obstruct Pulmon Dis* 2009;2:81–89.
27. Osoba D, Rodrigues G, Myles J, Zee B, Pater J. Interpreting the significance of changes in health-related quality-of-life scores. *J Clin Oncol* 1998;16:139–144.
28. Cocks K, King MT, Velikova G, Martyn St-James M, Fayers PM, Brown JM. Evidence-based guidelines for determination of sample size and interpretation of the European Organisation for the Research and Treatment of Cancer Quality of Life Questionnaire Core 30. *J Clin Oncol* 2011;29:89–96.
29. Singer S, Das-Munshi J, Brähler E. Prevalence of mental health conditions in cancer patients in acute care--a meta-analysis. *Ann Oncol* 2010;21:925–930.
30. Jacobi F, Wittchen H, Holting C, et al. Prevalence, co-morbidity and correlates of mental disorders in the general population: results from the German Health Interview and Examination Survey (GHS). *Psychol Med* 2004;34:597–611.
31. Weaver KE, Forsythe LP, Reeve BB, et al. Mental and physical health-related quality of life among U.S. cancer survivors: population estimates from the 2010 National Health Interview Survey. *Cancer Epidemiol Biomarkers Prev* 2012;21:2108–2117.

32. Carlson LE, Angen M, Cullum J, et al. High levels of untreated distress and fatigue in cancer patients. *Br. J. Cancer* 2004;90:2297–2304.
33. Zabora J, BrintzenhofeSzoc K, Curbow B, Hooker C, Piantadosi S. The prevalence of psychological distress by cancer site. *Psycho-Oncology* 2001;10:19–28.
34. Faller H, Schuler M, Richard M, Heckl U, Weis J, Küffner R. Effects of psycho-oncologic interventions on emotional distress and quality of life in adult patients with cancer: systematic review and meta-analysis. *J Clin Oncol* 2013;31:782–793.
35. Speck RM, Courneya KS, Mâsse LC, Duval S, Schmitz KH. An update of controlled physical activity trials in cancer survivors: a systematic review and meta-analysis. *J Cancer Surviv* 2010;4:87–100.
36. Babin E, Sigston E, Hitier M, Dehesdin D, Marie JP, Choussy O. Quality of life in head and neck cancers patients: predictive factors, functional and psychosocial outcome. *Eur Arch Otorhinolaryngol* 2008;265:265–270.
37. Hammerlid E, Silander E, Hörnestam L, Sullivan M. Health-related quality of life three years after diagnosis of head and neck cancer--a longitudinal study. *Head Neck* 2001;23:113–125.
38. Vilaseca I, Ballesteros F, Martínez-Vidal BM, Lehrer E, Bernal-Sprekelsen M, Blanch JL. Quality of life after transoral laser microresection of laryngeal cancer: a longitudinal study. *J Surg Oncol* 2013;108:52–56.
39. Olthoff A, Steuer-Vogt MK, Licht K, Sauer-Goenen M, Werner C, Ambrosch P. Quality of life after treatment for laryngeal carcinomas. *ORL J Otorhinolaryngol Relat Spec* 2006;68:253–258.
40. Ronis DL, Duffy SA, Fowler KE, Khan MJ, Terrell JE. Changes in quality of life over 1 year in patients with head and neck cancer. *Arch. Otolaryngol. Head Neck Surg* 2008;134:241–248.
41. Terrell JE, Ronis DL, Fowler KE, et al. Clinical predictors of quality of life in patients with head and neck cancer. *Arch Otolaryngol Head Neck Surg* 2004;130:401–408.

42. Smith JC, Johnson JT, Cognetti DM, et al. Quality of life, functional outcome, and costs of early glottic cancer. *Laryngoscope* 2003;113:68–76.
43. Veldhuis D, Probst G, Marek A, et al. Tumor site and disease stage as predictors of quality of life in head and neck cancer: A prospective study on patients treated with surgery or combined therapy with surgery and radiotherapy or radiochemotherapy. *Eur Arch Otorhinolaryngol* 2016;273:215–224.
44. Johansson M, Rydén A, Finizia C. Self evaluation of communication experiences after laryngeal cancer - a longitudinal questionnaire study in patients with laryngeal cancer. *BMC Cancer* 2008;8:80.

6 Anlagen

6.1 Darstellung des eigenen Beitrags

Der eigene Beitrag des Doktoranden Daniel Clasen bestand aus folgenden Punkten:

- Mitarbeit beim Erstellen des dem Manuskript zugrundeliegenden Studienkonzepts
- Planung und Durchführung eines Teils der persönlichen Interviews der Hauptstudie
- Aufbereitung der Daten in SPSS und Microsoft Excel
- statistische Auswertung des Datensatzes
- Mitarbeit bei der Interpretation der Ergebnisse
- Erstellen eines Manuskriptentwurfs, Verfassen und Übersetzen des endgültigen Manuskripts
- Publikation in der Fachzeitschrift „Head & Neck“, einschließlich Überarbeitung gemäß den Reviewer-Kommentaren

Bestätigung

Name	Datum	Unterschrift
Daniel Clasen (Korrespondenzautor)	16.01.18
Judith Keszte, MSc	15.02.18
Andreas Dietz, MD	19.12.2017
Jens Oeken, MD	3.1. 2018
Eberhard F. Meister, MD		
Orlando Guntinas-Lichius, MD		
Friedemann Pabst, MD		
Jens Büntzel, MD		
Eva-Maria Jenzewski, MD		
Susanne Singer, PhD	5.1.2018
Alexandra Meyer, PhD	14.12.2017

6.2 Selbstständigkeitserklärung

Erklärung über die eigenständige Abfassung der Arbeit

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und ohne unzulässige Hilfe oder Benutzung anderer als der angegebenen Hilfsmittel angefertigt habe. Ich versichere, dass Dritte von mir weder unmittelbar noch mittelbar eine Vergütung oder geldwerte Leistungen für Arbeiten erhalten haben, die im Zusammenhang mit dem Inhalt der vorgelegten Dissertation stehen, und dass die vorgelegte Arbeit weder im Inland noch im Ausland in gleicher oder ähnlicher Form einer anderen Prüfungsbehörde zum Zweck einer Promotion oder eines anderen Prüfungsverfahrens vorgelegt wurde. Alles aus anderen Quellen und von anderen Personen übernommene Material, das in der Arbeit verwendet wurde oder auf das direkt Bezug genommen wird, wurde als solches kenntlich gemacht. Insbesondere wurden alle Personen genannt, die direkt an der Entstehung der vorliegenden Arbeit beteiligt waren. Die aktuellen gesetzlichen Vorgaben in Bezug auf die Zulassung der klinischen Studien, die Bestimmungen des Tierschutzgesetzes, die Bestimmungen des Gentechnikgesetzes und die allgemeinen Datenschutzbestimmungen wurden eingehalten. Ich versichere, dass ich die Regelungen der Satzung der Universität Leipzig zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis kenne und eingehalten habe.

Leipzig 27.03.18
Datum

Unterschrift