**Brauchen wir gadoliniumhaltiges Kontrastmittel in der
Hirn-MRT-Diagnostik bei Kindern?**

Dissertation

zur Erlangung des akademischen Grades

Dr. med.

an der Medizinischen Fakultät

der Universität Leipzig

eingereicht von: Dennis Dünger

geboren am: 19.11.1988 in Riesa

angefertigt an: Universität Leipzig, Medizinische Fakultät
Abteilung für Kinderradiologie

Betreuer: Dr. med. Ina Sorge
Prof. Dr. med. Franz Wolfgang Hirsch

Beschluss über die Verleihung des Doktorgrads vom: 26.01.2021

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis.....	II
1. Einführung	1
1.1. Verwendung von Gadolinium als Kontrastmittel	1
1.1.1. Toxizität von freiem Gadolinium	1
1.1.2. Makrozyklische und lineare Gadolinium-Verbindungen	2
1.2. Akute unerwünschte Reaktionen.....	2
1.3. Nephrogene Systemische Fibrose (NSF)	4
1.3.1. Definition	4
1.3.2. Pathophysiologie	4
1.3.3. Ätiologie	5
1.3.4. Klinik	5
1.3.5. Prävention	6
1.4. Ablagerungen von Gadolinium	6
1.5. Gadolinium Deposition Disease (GDD)	8
1.5.1. Definition	8
1.5.2. Pathophysiologie.....	8
1.5.3. Klinik	8
1.5.4. Diagnostik und Behandlung	9
1.6. Zielsetzung der Arbeit	9
2. Publikation	10
3. Zusammenfassung	17
4. Literatur	22
5. Erklärung über die eigenständige Abfassung der Arbeit.....	27
6. Spezifizierung des eigenen wissenschaftlichen Beitrages.....	28

Abkürzungsverzeichnis

ATPase	Adenosintriphosphatase
Ca ²⁺	Ionisiertes Kalzium
DPTA	Diethylentriaminpentaessigsäure
EDTA	Ethylendiamintetraessigsäure
Gd	Gadolinium
Gd ³⁺	Ionisiertes Gadolinium
GDD	Gadolinium deposition disease
kg	Kilogramm
KM	Kontrastmittel
mmol	Millimol
MRT	Magnetresonanztomographie
NFκB	Nuklearer Faktor Kappa B
NLRP3	NACHT, LRR and PYD domains-containing protein 3
NPV	Negativer prädiktiver Wert
NSF	Nephrotische Systemische Fibrose (Nephrotic systemic fibrosis)
ZNS	Zentralnervensystem

1. Einführung

1.1. Verwendung von Gadolinium als Kontrastmittel

Gadolinium (Gd) wird seit 1988 für Hirnuntersuchungen mit der Magnetresonanztomographie (MRT) zur Kontrastverstärkung der Gefäße und zum Nachweis einer gestörten Gefäßwand-Integrität verwendet (Kanal, 2016). Es ist als Zusatzinformation, unter anderem bei der Inflammations- und bei der Tumordiagnostik des Gehirns, von hohem diagnostischem Wert. Auch im Bereich der Kinderradiologie wird es daher standardmäßig eingesetzt. Obwohl der Gebrauch von Gd-haltigem Kontrastmittel (KM) tendenziell abzunehmen scheint, gehört die Nutzung noch an vielen Kliniken zum Standard einer „lege artis“ durchgeführten Hirnuntersuchung im Kindesalter.

Gd ist ein Lanthanoid und seltenes Metall mit sieben unpaaren Elektronen (Todd und Kay, 2016). Daher wirkt es als paramagnetische Substanz, die zu einer Verkürzung der Relaxationszeit führt. Das dadurch entstehende Enhancement kann beispielsweise Defekte in der Bluthirnschranke aufdecken (Bellin et al., 2003; Engelhorn und Doerfler, 2008; Hesselink et al., 1988; Rogosnitzky und Branch, 2016; Scott, 2013).

Da freies Gd allerdings hochtoxisch ist, wird es nur in Verbindung mit Chelatoren verabreicht. Dabei werden makrozyklische und lineare sowie ionisierte und nicht ionisierte Verbindungen unterschieden.

1.1.1. Toxizität von freiem Gadolinium

Freies Gd ist schädlich, weil es einen ähnlichen Radius wie Kalzium besitzt (Gd^{3+} 107,8 pm; Ca^{2+} 114 pm) und daher an vielen spannungsabhängigen Kalziumkanälen als Antagonist wirkt. Dies ist einer der Gründe, weshalb Gd die Aktivität einiger Enzyme inhibiert (unter anderem Kalzium-abhängige ATPasen im sarkoplasmatischen Retikulum des Skelettmuskels, einige Dehydrogenasen und Kinasen) (Itoh und Kawakita, 1984; Port et al., 2008). Des Weiteren hemmt freies Gd die Phagozytose in Kupfferzellen und erhöht die Expression mehrerer Zytokine (Port et al., 2008). Letzte-

res wird mit der Nephrogenen Systemischen Fibrose in Verbindung gebracht, auf die später eingegangen wird.

1.1.2. Makrozyklische und lineare Gadolinium-Verbindungen

Um zu verhindern, dass freies Gd in den Körper gerät und somit seine toxischen Wirkungen entfalten kann, wird es bei der KM-Gabe nur in Verbindung mit Chelatoren verabreicht. Dabei unterscheidet man makrozyklische und lineare Verbindungen, die ionisiert oder nicht ionisiert vorliegen können. Am stabilsten sind makrozyklische Chelatoren, da hier das Gd regelrecht „gefangen“ wird (Port et al., 2008; Todd und Kay, 2016). Ionisierte lineare Verbindungen sind instabiler und nicht ionisierte lineare Chelatoren haben die labilsten Eigenschaften (Todd und Kay, 2016).

1.2. Akute unerwünschte Reaktionen

Erfolgt die Gd-Gabe in den vorgeschriebenen Dosen (0,1 bis 0,2 mmol/kg Körpergewicht für die meisten Präparate), dann wird es von der großen Mehrheit der Patienten sehr gut vertragen. Akute unerwünschte Reaktionen treten in 0,07 bis 2,4 % der Fälle auf (Forghani, 2016; Ramalho et al., 2016b).

Die akuten unerwünschten Reaktionen lassen sich nach deren Mechanismus und Schwere einteilen. Bezüglich des Mechanismus existieren sofortige Hypersensitivitätsreaktionen (allergieartig), die üblicherweise Sekunden oder Minuten nach der Injektion auftreten. Davon abzugrenzen sind die physiologischen Reaktionen, die mit Kälte- oder Wärmegefühl beziehungsweise Schmerz an der Injektionsstelle einhergehen und/oder zu Übelkeit mit oder ohne Erbrechen, Kopfschmerzen, Parästhesien und Schwindel führen. Betrachtet man die Schwere der akuten unerwünschten Reaktionen, so kann man diese in milde, moderate und schwere Verläufe klassifizieren. Die milden Reaktionen sind selbstlimitierend und zeigen kein Fortschreiten. Zu den moderaten Verläufen zählt ein stärker ausgeprägtes Erscheinungsbild, zum Beispiel Bronchospasmus, laryngeales Ödem und/oder generalisierte Erytheme. Schwere Reaktionen sind lebensbedrohlich und beinhalten unter anderem schwere laryngeale

Ödeme, Krämpfe, schwere Hypotension, Teilnahmslosigkeit und Arrhythmien (Chandra und Mohan, 2016; Ramalho et al., 2016a).

Die meisten akuten unerwünschten Reaktionen aufgrund der Gd-haltigen KM-Applikationen haben einen milden und physiologischen Charakter. Allergieartige Erscheinungen sind selten und in einer Häufigkeit von 0,004 bis 0,7 % der Fälle zu beobachten (Chandra und Mohan, 2016). Schwere, lebensbedrohliche Reaktionen wurden in der Vergangenheit zwar beschrieben, aber nur in äußerst niedriger Rate (0,001 bis 0,01 %) (Chandra und Mohan, 2016; Murphy et al., 1996; Ramalho et al., 2016a; Runge, 2000). Zwischen den Jahren 2004 und 2009 sind bei 51 Millionen Patienten, denen Gd verabreicht wurde, lediglich 40 Todesfälle beklagt worden (Prince et al., 2011).

Patienten, die an Asthma oder anderen Allergien leiden, haben ein leicht erhöhtes Risiko für allergieartige Reaktionen durch die Gd-Applikation. Da allerdings die Wahrscheinlichkeit für einen komplizierten Verlauf sehr gering ist, treffen viele Institutionen diesbezüglich keine besonderen Vorkehrungen (Ramalho et al., 2016a). Personen, die bereits zuvor an allergischen Reaktionen nach Gd-Gabe litten, zeigen auch nachfolgend ein höheres Risiko für Beschwerden bei einer erneuten Applikation (Jung et al., 2012; Prince et al., 2011). Bei diesen Patienten sollte der Wechsel auf ein anderes KM-Präparat erwogen werden oder es besteht die Möglichkeit einer präventiven Gabe von Antihistaminika und systemischen Glukokortikoiden (Jung et al., 2012).

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass akute unerwünschte Reaktionen aufgrund einer Gd-Applikation existieren und diese auch sehr schwer ausfallen können. Allerdings treten sie nur sehr selten auf, sodass Gd diesbezüglich als sehr sicher gilt.

1.3. Nephrogene Systemische Fibrose (NSF)

1.3.1. Definition

Nephrogene Systemische Fibrose ist eine fibrosierende Störung, die mit Exposition von Gd-haltigen KM bei Menschen mit schwerer Niereninsuffizienz assoziiert ist (Nardone et al., 2014).

1.3.2. Pathophysiologie

Bei der Einführung von Gd (1988) galt dieses zunächst, im Gegensatz zu iodhaltigen Produkten, als äußerst nephroprotektiv. Daher fanden die Gd-assoziierten KM vor allem bei nierengeschädigten Patienten Anwendung (Todd und Kay, 2016). Erst im Jahr 2006 wurde ein Zusammenhang zwischen Gd-Gabe bei niereninsuffizienten Patienten und NSF hergestellt (Todd und Kay, 2016).

Bezüglich der Entstehung der NSF ist eine der führenden Hypothesen, dass durch die renale Schädigung ein verlängerter Verbleib des an den Chelator gebundenen Gd im Körper resultiert. Daraus folgt eine erhöhte Kontamination mit freiem Gd, das sich allmählich vom Chelator löst (Port et al., 2008). Ein weiterer Faktor, der die Menge des im Körper vorkommenden freien Gd erhöht, ist die Transmetallation mit anderen Kationen. Dabei binden beispielsweise Kupfer-, Kalzium- oder Eisenionen an den Chelator, wodurch Gd freigesetzt wird (Idée et al., 2006). Folglich kommt es zur Aufnahme des freien Gd ins Gewebe (Abraham und Thakral, 2008; Cacheris et al., 1990; Franano et al., 1995; George et al., 2010), wo jenes, partikelweise, durch Makrophagen mittels Phagozytose internalisiert wird. Rupturiert ein solches Phagosom, kommt es zur Freisetzung des Gd in das Zytosol. Daraus resultiert eine Aktivierung des „Nuclear factor Kappa B“ (NFκB) (Del Galdo et al., 2010), wodurch Makrophagen über NLRP3 Inflammasome stimuliert werden (Schmidt-Lauber et al., 2015). Eine vermehrte Produktion von profibrotischen Cytokinen ist die Folge (Del Galdo et al., 2010; Wermuth et al., 2009), welche Fibroblasten aktivieren und schließlich die

Produktion von extrazellulärer Matrix steigern (Bhagavathula et al., 2009; Edward et al., 2008).

1.3.3. Ätiologie

Betrachtet man das Patientenkollektiv, so fällt auf, dass NSF unabhängig von Alter, Geschlecht, Ethnie oder Ätiologie der Nierenerkrankung auftritt (Jain et al., 2004). Die einzige Gemeinsamkeit aller Betroffenen ist die beeinträchtigte Nierenfunktion. Obwohl in den meisten Fällen eine chronische Niereninsuffizienz des Stadiums 5 vorlag, wurde NSF auch bei Patienten im Stadium 4 und sogar 3 diagnostiziert (Prince et al., 2008; Sadowski et al., 2007). Allerdings muss nicht immer eine chronische renale Funktionsbeeinträchtigung vorliegen. Auch einige Patienten, denen während einer schweren akuten Nierenschädigung Gd-haltiges KM verabreicht wurde, litten später an NSF (Cassis et al., 2006).

Wie bereits erwähnt, sind die linearen, nicht ionisierten Verbindungen am labilsten. Es ist daher nicht verwunderlich, dass die große Mehrheit an NSF-Erkrankten mit dieser Art von KM in Verbindung gebracht wird (Todd und Kay, 2016). Weiterhin beschreiben Studien eine Dosis-Beziehung: je höher die Menge und je labiler das verabreichte Gd, desto größer das Risiko einer Erkrankung (Abujudeh et al., 2009; Broome et al., 2007; Collidge et al., 2007; Marckmann et al., 2007; Martin et al., 2010; Perez-Rodriguez et al., 2009). Der Zeitraum zwischen der letzten KM-Applikation und dem Ausbruch einer möglichen NSF ist sehr verschieden und kann von Tagen bis zu Jahren reichen (Collidge et al., 2007; Grobner, 2006; Todd und Kay, 2016). Abschließend muss jedoch erwähnt werden, dass weitere, nicht bekannte Ursachen eine Rolle spielen müssen: Nicht jeder Patient mit einer Nierenschädigung bildet nach Gd-Applikation eine NSF aus (Todd und Kay, 2016).

1.3.4. Klinik

Die Klinik der NSF zeigt ein vielfältiges, aber typisches Bild. Die Frühsymptome präsentieren sich häufig unspezifisch mit Schwäche, Juckreiz oder Schmerz in den distalen Extremitäten (Girardi et al., 2011; Todd und Kay, 2016). Frühe dermatologische Befunde sind ebenfalls unspezifisch. Indurierte erythematöse Papeln und Plaques

sind regelmäßig zu erkennen, genauso wie Weichteilödeme. Bei einer etablierten NSF hingegen zeigen sich hyperpigmentierte, harte und verdickte Hauterscheinungen, die mit dem darunter liegenden Weichteilgewebe in Verbindung stehen (Girardi et al., 2011; Todd und Kay, 2016). Da auch die Haut und die Faszien im Bereich der Gelenke betroffen sein können, sind Kontrakturen ebenfalls ein Bestandteil der Klinik. Daraus resultierend zeigen sich bei entsprechender Ausprägung der NSF Blockierungen und heftige Schmerzen. Häufiger sind die unteren Extremitäten betroffen (Perez-Rodriguez et al., 2009; Todd et al., 2007). Die Symptome zeigen ein symmetrisches Bild auf beiden Seiten und ein Fortschreiten von distal nach proximal, sodass ebenfalls Beschwerden am Oberkörper auftreten können (Jiménez et al., 2004). Die Klinik beschränkt sich nicht auf die Haut. Eine Beteiligung von Skelettmuskel, Herzmuskel, Blutgefäße, Pleura, Lunge, Hoden, renaler Tubulus, Dura mater und Sklera wurden ebenfalls beschrieben (Jiménez et al., 2004; Ting et al., 2003). Als Konsequenz der NSF zeigt sich eine erhöhte Mortalität, die häufig aus respiratorischen oder infektiösen Komplikationen resultiert (Jiménez et al., 2004; Swaminathan et al., 2008; Todd et al., 2007).

1.3.5. Prävention

Die Prävention der NSF ergibt sich aus der Vermeidung der verursachenden Faktoren. Demzufolge sollten die labilsten KM-Verbindungen nach Möglichkeit nicht genutzt werden und insbesondere bei Patienten mit Nierenschädigung ist auf einen vorsichtigen Umgang zu achten. Wenn möglich, sollte hier keine Gd-Gabe erfolgen, allenfalls aber die geringste nötige Dosis eines makrozyklischen Vertreters (Todd und Kay, 2016). Liegt eine schwere renale Insuffizienz vor, so kann eine Hämodialyse erwogen werden, auch wenn sich zeigte, dass diese Maßnahme die Ausbildung einer NSF nicht sicher verhindert (Broome et al., 2007). Seit dem Einhalten dieser präventiven Maßnahmen sind nur wenige neue Fälle bekannt (Todd und Kay, 2016).

1.4. Ablagerungen von Gadolinium

Durch vermehrte Exposition von Gd-haltigem KM kann es zu dessen Ablagerung kommen, obwohl die Patienten keine Nierenfunktionsstörung haben. Messungen

ergaben, dass bei Anwendung der linearen Chelatoren, gegenüber den makrozyklischen Produkten, eine 2,5fach erhöhte Konzentration erreicht wurde (White et al., 2006). Ursache ist wahrscheinlich die bereits besprochene geringere Stabilität der linearen Verbindungen. Allerdings sind auch die gefundenen Ablagerungen bei den makrozyklischen Vertretern besorgniserregend (McDonald et al., 2015).

Bei häufiger Applikation kann es zu Gd-Ansammlungen in verschiedenen Körperpartien kommen. Dafür reichten in Einzelfällen bereits vier Anwendungen aus (McDonald et al., 2015). Betroffene Organe waren Haut (Roberts et al., 2016b), Knochen (Darrach et al., 2009; Murata et al., 2016; Ramalho et al., 2016a; White et al., 2006) und Leber (Maximova et al., 2016). Das Gd scheint außerdem in der Lage zu sein, die Blut-Hirn-Schranke zu überwinden, wodurch erhöhte Konzentrationen im Gehirn nachweisbar waren: Häufigste Fundorte waren der Nucleus dentatus und Globus pallidus (Kanda et al., 2016; Roberts und Holden, 2016). Besondere Besorgnis erregt der Fakt, dass diese Befunde auch bei Kindern auftraten (Flood et al., 2017; Hu et al., 2016; Miller et al., 2015; Roberts et al., 2016a; Roberts und Holden, 2016).

Die Folgen dieser Ablagerungen sind bisher völlig unklar (Roberts und Holden, 2016). Es könnte eine wichtige Rolle spielen, ob sich das Gd an seinem Chelator gebunden festsetzt oder vorher dissoziierte und nun frei, oder an einem anderen Molekül gebunden, vorliegt. Doch auch diese Frage konnte bisher nicht beantwortet werden (Rogosnitzky und Branch, 2016). Mögliche Auswirkungen auf das kindliche Wachstum und Gehirn sollten besonderer Aufmerksamkeit gelten, denn gerade die jungen Patienten befinden sich in einer anfälligen Phase für das ZNS bezüglich toxischer Substanzen wie Gd (Roberts und Holden, 2016).

Ein vorsichtiger Umgang mit dem KM sollte daher, vor allem bei Kindern, angestrebt werden. Autoren wie Kanda et al. (2016) und Roberts und Holden (2016) empfehlen die Anwendung möglichst geringer Dosen von stabilen (also makrozyklischen) Komplexen. Nicht zuletzt sollte stets eine Risiko-Nutzen-Analyse vor jedem Gebrauch erfolgen.

1.5. Gadolinium Deposition Disease (GDD)

1.5.1. Definition

GDD kann als Zwischenstufe von dem im vorherigen Kapitel beschriebenen asymptomatischen Gd-Ablagerungen und NSF angesehen werden. Es handelt sich demnach um Ablagerungen des Lanthanoids, die ähnliche Symptome wie NSF hervorrufen, jedoch in abgeschwächter Form (Ramalho et al., 2016a).

1.5.2. Pathophysiologie

Der genaue Mechanismus ist noch unklar. Da der Zeitraum zwischen Gd-Applikation und Auftreten der Symptome im Bereich von Stunden bis Tagen liegt und damit deutlich kürzer ist als bei NSF (eher Wochen bis Monate), vermuten Ramalho et al. eine Kombination von akuten (Polypeptid-vermittelten) und subakuten (zellvermittelten) unerwünschten Wirkungen (Ramalho et al., 2016a). Es wurde festgestellt, dass nach jeglicher Gabe von Gd-haltigem KM eine Erhöhung von Cytokinen und Chemokinen folgt (Wermuth und Jimenez, 2014). Diese Reaktion kann bei jedem Individuum verschieden stark ausgeprägt sein und stellt eine mögliche Erklärung für die akute Komponente der GDD dar.

Der Pathomechanismus des subakuten Auftretens ist vermutlich dem der NSF sehr ähnlich (Ramalho et al., 2016a) und wurde bereits im vorherigen Kapitel dieser Arbeit beschrieben.

Ein weiterer vermuteter Faktor ist eine genetische Metabolisierungsstörung von Schwermetallen, die zu einer Aktivierung des Immunsystems führt (Ramalho et al., 2016a).

1.5.3. Klinik

Zwei Komponenten scheinen die im Folgenden aufgezählten Symptome hervorzurufen: die Präsenz von Gd im Körper und die entsprechende immunologische Antwort darauf. Wie bereits erwähnt, ähnelt das Erscheinungsbild der GDD stark der NSF, allerdings in abgeschwächter Form. Folgende Symptome wurden beschrieben:

- Knochenschmerzen
- Brennender Schmerz im kutanen und subkutanen Gewebe
- Verdickungen und Verfärbungen der Haut und des subkutanen Gewebes (im fortgeschrittenen Stadium)

- Wahrnehmungsstörungen („brain fog“)

(Burke et al., 2016)

1.5.4. Diagnostik und Behandlung

Ramalho et al. empfehlen, eine 24-Stunden-Urin-Untersuchung frühestens 30 Tage nach der Gd-Applikation durchzuführen, um eine mögliche Erhöhung des Gd im Körper mit den vorhandenen Symptomen abzugleichen und so eine entsprechende Diagnose stellen zu können. Alternativen sind Blutentnahmen, die aber wegen ihres geringeren Volumens weniger Aussagekraft haben. Eine weitere Maßnahme stellen Gewebeproben dar, wobei aber das entsprechende Nebenwirkungsprofil beachtet werden muss (Ramalho et al., 2016a).

Ausgehend von der Theorie, dass GDD eine genetische Metabolisierungsstörung von Gd zugrunde liegt, die zu einer Aktivierung des Immunsystems führt, besteht eine mögliche Behandlung aus der Kombination von Chelattherapie und Immunsystemmodulation (Ramalho et al., 2016a). Der Komplexbildner Ethylendiamintetraessigsäure (EDTA) scheint dabei weniger gut zu wirken als Diethylentriaminpentaessigsäure (DPTA), da er stärker kleine Atome bindet. DPTA hat hingegen eine höhere Affinität zu Gd und eine längere Bindungszeit, die zu einer verbesserten renalen Ausscheidung führt. Bezüglich der Therapie, die am Immunsystem greift, können noch keine klaren Empfehlungen gegeben werden. Ein Wirkstoff, der eine hemmende Wirkung auf Cytokine oder Chemokine besitzt, wäre wahrscheinlich Mittel der Wahl (Ramalho et al., 2016a).

1.6. Zielsetzung der Arbeit

Gd wird seit 1988 als KM für Hirn-Magnetresonanztomographie-Untersuchungen verwendet und gilt auch heute noch in vielen Kliniken als Standard einer „lege artis“ durchgeführten pädiatrischen Hirnuntersuchung. Es galt lange Zeit als sehr nebenwirkungsarm, doch in den letzten Jahren wurden vermehrt Studien veröffentlicht, die von zum Teil schweren Folgen aufgrund der Gd-Applikation berichten (Nephrotische Systemische Fibrose, Gadolinium deposition disease). Weiterhin konnten vermehrt Ablagerungen im Gehirn und anderen Organen nachgewiesen werden, deren Auswirkungen noch völlig unklar sind. Ein vorsichtiger, indikationsabhängiger Umgang mit Gd-haltigen KM scheint daher, vor allem bei pädiatrischen Patienten, geboten.

Ziel der Studie war es, den diagnostischen Zugewinn durch die generelle Gabe von Gd bei Kindern zu beurteilen, wenn initial im nativen Hirn-MRT kein pathologischer Befund zu finden war.

2. Publikation

Pediatr Radiol
DOI 10.1007/s00247-017-3999-2

ORIGINAL ARTICLE

Do we need gadolinium-based contrast medium for brain magnetic resonance imaging in children?

Dennis Dünger¹ · Matthias Krause² · Daniel Gräfe¹ · Andreas Merckenschlager³ · Christian Roth¹ · Ina Sorge¹

Received: 25 April 2017 / Revised: 5 September 2017 / Accepted: 26 September 2017
© Springer-Verlag GmbH Germany 2017

Abstract

Background Brain imaging is the most common examination in pediatric magnetic resonance imaging (MRI), often combined with the use of a gadolinium-based contrast medium. The application of gadolinium-based contrast medium poses some risk. There is limited evidence of the benefits of contrast medium in pediatric brain imaging.

Objective To assess the diagnostic gain of contrast-enhanced sequences in brain MRI when the unenhanced sequences are normal.

Materials and methods We retrospectively assessed 6,683 brain MR examinations using contrast medium in children younger than 16 years in the pediatric radiology department of the University Hospital Leipzig to determine whether contrast-enhanced sequences delivered additional, clinically relevant information to pre-contrast sequences. All examinations were executed using a 1.5-T or a 3-T system.

Results In 8 of 3,003 (95% confidence interval 0.12–0.52%) unenhanced normal brain examinations, a relevant additional finding was detected when contrast medium was administered. Contrast enhancement led to a change in diagnosis in only one of these cases.

Conclusion Children with a normal pre-contrast brain MRI rarely benefit from contrast medium application. Comparing these results to the risks and disadvantages of a routine gadolinium application, there is substantiated numerical evidence for avoiding routine administration of gadolinium in a pre-contrast normal MRI examination.

Keywords Brain · Children · Contrast medium · Diagnostic value · Gadolinium · Magnetic resonance imaging

Introduction

Gadolinium has been used since 1988 for MRI brain scans for contrast enhancement of the vessels and to provide evidence of impaired vessel wall integrity [1]. The latter is of high diagnostic value for inflammation and tumor diagnostics and is therefore a standard part of brain scans in children at most hospitals.

In 2006 the first reports of potentially fatal long-term effects of gadolinium application linked to the appearance of nephrogenic systemic fibrosis came as a surprise. This disease is caused by gadolinium-based contrast medium in patients with renal insufficiency [2–6]. Todd and Kay [3] suggested the term gadolinium-induced fibrosis. Though rare, the sometimes fatal course of this disease led to regulatory warnings for gadolinium-based contrast medium in 2006. Subsequently, consequences of gadolinium administration were also detected in patients with intact kidney function. Depositions of gadolinium were found primarily in the pallidum and dentate nucleus [7–19]. Clinical consequences have not been clarified, but considering the rare cases of nephrogenic systemic fibrosis, long-term effects from gadolinium molecules in the brain cannot be ruled out, especially in pediatrics, with many decades of possible incubation. Therefore every use of gadolinium-based contrast medium should follow a reasonable indication with risk–benefit ratio.

✉ Ina Sorge
Ina.Sorge@medizin.uni-leipzig.de

¹ Department of Paediatric Radiology,
University Leipzig,
Liebigstrasse 20a, 04103 Leipzig, Germany

² Department of Neurosurgery/Paediatric Neurosurgery,
University Leipzig,
Leipzig, Germany

³ Department of Woman and Child Health, Hospital for Children & Adolescents, University Leipzig, Leipzig, Germany

Table 1 Age distribution of the patients ($n=6,683$)

Age	0–28 days	29 days to 1 year	2–3 years	4–5 years	6–16 years
Number of patients	59	908	836	774	4,106

Because scientific evidence concerning this subject is lacking, we assessed the diagnostic benefit of gadolinium administration in children after a normal unenhanced brain MRI scan.

Materials and methods

We retrospectively re-evaluated all brain MRI scans from children younger than 17 years performed between July 2005 and October 2016 in the pediatric radiology department of the University Hospital Leipzig (Table 1). The institution has a wide orientation typical for a German university hospital (1,500 beds) and a diverse pediatric neurological and oncological patient collective (comparable with a tertiary-care hospital). The MRI scans were conducted either on a 1.5-T system (Intera; Philips, Amsterdam, the Netherlands) or a 3-T system (Trio Tim; Siemens, Erlangen, Germany).

All MRI studies were re-assessed by two pediatric radiologists (IS, WH), with 13 years and 20 years of MRI experience, in a consensus procedure. Initially we recorded all pediatric brain examinations ($n=10,474$) and then we assessed those with contrast medium application ($n=7,248$) separately. We excluded brain examinations of the pituitary gland and those for non-central-nervous-system indications.

We evaluated the following set of sequences as a minimum: axial T2-weighted turbo spin echo, axial fluid-attenuation inversion recovery, axial T1-weighted turbo spin echo or 3-D gradient echo before and after application of contrast medium. A diffusion-weighted sequence was available in 43% of the examinations.

In 31% ($n=3,226$) of the brain scans, no contrast medium was applied for medical indications (e.g., examination of ventricular width for hydrocephalus). Of the 7,248 contrast-enhanced brain MRI scans, only 6,683 (92%) met the inclusion criteria (Table 2).

Gadolinium preparations employed in these examinations were Magnevist (Bayer, Leverkusen, Germany), Omniscan (GE Healthcare, Chalfont St. Giles, UK) and MultiHance (Bracco, Milan, Italy), all linear contrast media; and Dotarem (Guerbet, Villepointe, France) and Gadovist (Bayer, Leverkusen, Germany), both macrocyclic contrast media at a dose of 0.1 mmol/kg body weight.

The clinical data were part of the routine diagnostics. Because the study was retrospective in design and did not examine patients' personal information, the evaluation was ethically uncritical and did not need an explicit vote of the local ethics committee.

We categorized the indications for brain imaging into 12 groups (Fig. 1). Neurological indications not categorized as "seizures" were summarized under "neurology," such as hemiparesis, paraesthesia, dizziness and ataxia. Psychiatric indications were those such as anorexia, psychoses, behavioral disorders, personality disorders and panic attacks. Indications could be assigned to multiple categories.

Three-fourths of the examinations were classified as either suspected or known brain tumor (29.5%), clinically proven neurological findings (24.8%) or seizures (21.2%). The residual indications, in descending order, were developmental disorder or malformation (13%), headaches (10.2%), brain pressure (6.1%), psychiatry (5.4%), inflammation (4.3%), dilation of liquor spaces (2.6%), vascular malformation (2.4%), trauma (1.1%) and other (0.6%) (Fig. 1).

For each MR examination, we determined whether abnormal findings were detected before contrast medium administration. Subsequently, we evaluated diagnostic benefit of additional post-contrast sequences. A finding in native MRI sequences was classified as abnormal when artifacts had been ruled out and possible pathological implications were recorded, namely signal alterations of white or gray matter, ventricular enlargement, structural cerebral disorders and — if conducted — diffusion disorders.

Table 2 Inclusion and exclusion criteria

Inclusion criteria <17 years	Exclusion criteria ≥17 years
Brain-related indication	1. Non-brain-related indications (for instance orbital or skull MRI) 2. Examinations of the pituitary gland
Availability of every of the following sequences: axial T2-TSE, T1-TSE (alternatively 3D-GRE) before and after contrast medium	One of the following sequences missing: axial T2-TSE, T1-TSE (alternatively 3-D GRE) before and after contrast medium

GRE gradient recalled echo, *MRI* magnetic resonance imaging, *TSE* turbo spin echo

Fig. 1 Clinical reasons for brain MRI (percentages)

Post-contrast MRI findings were designated as “relevant additional findings” when contrast enhancement yielded additional or divergent diagnoses. The remaining additional findings were classified as “irrelevant coincidental findings.” Abnormal findings in unenhanced MRI were grouped according to the algorithm shown in Fig. 2.

We analyzed statistical relations between relevant and irrelevant additional findings. We estimated the likelihood of contrast medium administration adding diagnostic benefit to an otherwise normal brain.

Results

Normal unenhanced MRI

In almost half of the examinations (3,003 of 6,683; 44.9%), no abnormality was found before administration of gadolinium-based contrast medium. In 2,855 of these 3,003 cases (95.1%) no pathological finding was detected even after contrast medium administration. *Irrelevant coincidental findings* were registered in 140 of these

Fig. 2 Algorithm for further classification of the MRI findings. CM contrast medium

Fig. 3 Example of additional findings after application of contrast medium: post-contrast-medium extensive meningeal enhancement in a boy (3 weeks) with meningitis (1.5 T, T1-weighted spin-echo transverse section MRI, repetition time [TR]/echo time [TE]=696/15.5 ms, slice thickness 3 mm)

3,003 patients (4.7%), of which developmental venous anomalies represented the most frequent pathology. Eight of the 3,003 examinations (0.3%, 95% confidence interval 0.12–0.52%), revealed a *relevant additional finding* after gadolinium application, all of them pathological meningeal enhancement (Fig. 3). In other words, administration of contrast medium in examinations without pathological findings in unenhanced sequences has an estimated likelihood of 0.12–0.52% of adding any relevant information in cohorts similar to the one studied here.

In the eight normal unenhanced MRI scans that demonstrated pathological meningeal enhancement after application of contrast medium, two had been scanned at 3 T and six at 1.5 T (Table 3).

Abnormal unenhanced MRI

In 3,680 of 6,683 examinations (55.1%) an abnormality was found before administration of gadolinium-based contrast medium. Out of these 3,680 children, contrast enhancement application in 2,511 (68.2%) did not result in an abnormal enhancement in any brain area. In the other 1,169 scans (31.8%), enhancement was detected in the area already described as abnormal in the pre-contrast sequences. An “irrelevant coincidental finding” affecting previously normal regions was determined in 102/3,680 (2.8%) cases, with developmental venous anomalies representing the most frequent entity. However, in 297/3,680 scans (8.1%, 95% confidence interval 7.2–9.0%), contrast medium application disclosed one or several “relevant additional findings” in otherwise normal brain regions. These relevant additional findings were, among others, meningeal contrast-medium enhancement and additional information about the tumor spreading or an impaired blood–brain barrier (Fig. 4).

Additional findings were found most frequently in the setting of specific anomalies in pre-contrast sequences as follows: tumor (76.4%), any pathology in MRI correlating to neurological pathologies (8.8%), seizures (6.4%), inflammation (5.7%) and signs of elevated intracranial pressure (5.1%).

Discussion

To the best of our knowledge, no study with a comparable number of patients has analyzed the diagnostic benefit of contrast medium administration in pediatric cerebral MRI. Every study dedicated to this subject has involved a significantly lower number of patients [20–24]. Moreover, most studies were at least 10 years of age, and several authors dealt exclusively with children younger than 2 years. Petrou et al. [23] and Foerster et al. [24] evaluated the benefits of contrast medium administration in that age group, labeling the additional results as not helpful, helpful or even essential. Petrou et al.

Table 3 Cases with normal unenhanced MRI and pathological meningeal enhancement after application of contrast medium

Age	Indications	Contrast medium	Field strength (T)	Findings	Diagnostic impact
3 weeks	Meningitis (<i>E. coli</i>)	2.5 mL Omniscan	1.5	Meningeal enhancement	None
10 months	Meningitis (pneumococci)	1 mL MultiHance	1.5	Meningeal enhancement	None
4 years	Meningitis (<i>Haemophilus influenzae</i>)	2 mL Gadovist	3	Meningeal enhancement	None
15 years	Meningitis (neuroborreliosis)	6 mL Gadovist	1.5	Meningeal enhancement	None
11 years	Headaches, dizziness and nausea	3 mL Gadovist	1.5	Meningeal enhancement	None
13 years	Headaches, dizziness, vomiting	12 mL Omniscan	1.5	Meningeal enhancement	New diagnosis: viral meningitis (enterovirus)
15 years	Fever and fracture of the temporal bone	5 mL Gadovist	1.5	Meningeal enhancement	None
15 years	Burkitt lymphoma	6.5 mL Gadovist	3	Meningeal enhancement	None

Fig. 4 Example of additional findings after application of contrast medium: slightly intensified contrast-medium enhancement of the meninges in a girl (13 years) with headaches and dizziness and diagnosis of meningitis (1.5 T, T1-weighted spin-echo coronal MRI section, TR/TE 500/7.7 ms, slice thickness 5 mm). TE echo time, TR repetition time

retrospectively examined 437 children with seizures. Contrast-medium administration was regarded to be helpful in 5.9% of the children and even essential for diagnosis in 1.8%, all of them presenting with a history of infection. Therefore, the authors recommended contrast-medium application when infection or tumor is suspected.

Foerster et al. [24] focused retrospectively on contrast-enhanced brain MRIs of developmentally delayed children. In 107 of 170 children, when developmental delay represented the primary indication for brain MRI, contrast-medium administration proved neither helpful nor essential. In the remaining children (63 of 170) with developmental delay as secondary diagnosis, contrast-medium application was assessed as helpful in 11% but did not prove to be essential in any child. The majority of these cases were associated with neoplasia or infections. The authors argued that a contrast-medium application might pose a benefit only in the setting of suspected tumor or brain/meningeal infection. Eldevik and Brunberg [22] prospectively evaluated brain MR images from 125 children younger than 2 years, before and after contrast-medium administration. In four cases gadolinium administration after an already abnormal pre-contrast MRI was found to be essential for final diagnosis. In all children with unenhanced normal MRI (45 of 125) contrast-medium application did not result in a pathological enhancement. Thus, the authors summarized that contrast medium might not be necessary in children with normal results in unenhanced brain MRI.

The studies by Elster and Rieser [20] and Baierl et al. [21] are the most similar to our study with regard to the cohort. Elster et al. included 65 children and adolescents between 0

and 18 years of age. Evaluating prospectively pre- and post-contrast brain MR images, gadolinium enhancement was extremely helpful in 4 of 65 (6%) patients (all with tumor disease) and moderately helpful in 4 (6%) patients. However, in all of these lesions unenhanced MRI already disclosed abnormal findings. Patients with normal unenhanced MRIs did not prove any diagnostic benefit from contrast medium application. In concordance with previous studies the authors concluded that application of gadolinium-based contrast media as a matter of routine is not justified, yet after abnormal findings in unenhanced MRI and in the setting of suspected tumor or inflammatory brain disease, contrast medium should be employed.

Baierl et al. [21] examined 40 children and adolescents between 1 year and 16 years of age with suspected neoplasia, infection or vascular diseases. Twelve of 40 (30%) children in this cohort had normal unenhanced MRI. In 2 of these 12 cases (17%) the application of gadolinium led to a tumor diagnosis. However, it should be considered that on the one hand, the authors only examined children with the suspected diagnosis, for which a contrast-medium administration had also already been found to be helpful by other studies. On the other hand, the study dates to 1990 and it has to be expected that contemporary unenhanced sequences are of significantly better quality because of their higher magnetic flux density (tesla) and higher spatial resolution. Despite that, this study recommended that contrast medium should be applied in cases of abnormal unenhanced MR images or for suspicion of tumor or infection.

Normal unenhanced MRI

A relevant additional finding was found only in 8 of 3,003 of our patients (0.3%) after gadolinium application, all of them presenting as pathological meningeal enhancement. With a negative predictive value of 0.997, the probability of missing a relevant pathological meningeal enhancement in the case of a normal unenhanced MRI is approximately 3 per mill. In order to evaluate the impact for diagnosis and treatment of the finding in our 8 patients with pathological meningeal enhancement, we analyzed every case in detail (Table 3).

In four children bacterial meningitis was causative for the pathological meningeal enhancement (meningitis from *E. coli*, *Haemophilus influenzae*, pneumococci, neuroborreliosis). The enhancement could either be interpreted as a result of inflammation or as a sequela of a previous lumbar puncture and was not regarded as an unexpected finding.

In one child with nonspecific neurological complaints (headaches, dizziness, vomiting) the pathological meningeal enhancement finally led to the diagnosis of viral meningitis from enterovirus (proved by lumbar puncture).

In another child the MRI was conducted after a traffic accident. Because of fever in conjunction with a fracture of the

temporal bone, the MRI was performed to rule out intracranial inflammation. The meningeal enhancement in this case can be interpreted as meningeal irritation after trauma.

In one child with Burkitt lymphoma a lumbar puncture was conducted before the MRI, implying the assumption that this enhancement might be as equal of this procedure.

In one child presenting with headaches, dizziness and nausea the pathological meningeal enhancement was also interpreted as a result of suspected meningitis. However, lumbar puncture failed to confirm this diagnosis. At follow-up examinations no meningeal pathology was found. Therefore, the meningeal contrast enhancement remains nonspecific without probable impact.

Abnormal unenhanced MRI

In 3,680 (55.1%) of our patients, there were anomalies in unenhanced examinations. In these cases contrast medium served to further characterize lesions marked as abnormal even in unenhanced MRI.

There is a consensus that in the presence of pathological results in unenhanced MRI, contrast medium should be administered to further characterize these lesions. It improves the exact description of the overall appearance, the borders and vascularization [25]. Thus contrast-enhanced sequences are a part of diagnostic criteria in several diseases, e.g., autoimmune diseases. In our study, 8.1% of cases had additional findings after contrast-medium administration located beyond the abnormal areas already revealed in pre-contrast sequences. In three quarters of these children, MRIs were performed for (suspected or known) neoplasia. In tumor diagnostics the benefit of contrast-enhanced images has been proved in several studies [20–24]. Therefore, gadolinium-based contrast medium should be administered in adults and children when a tumor is suspected. However, absence of unenhanced abnormal lesions is also of diagnostic value. Eldevik and Brunberg [22] found that in 22 of 125 children younger than 2 years a negative enhancement provided helpful diagnostic information.

Our study has several limitations, including lack of clinical information. Many children got an MRI examination with contrast medium for several indications. Furthermore, all data were gathered from only one institution, the University Hospital in Leipzig, making the results comparable only to children's hospitals of the same size and structure.

Conclusion

Our study demonstrates that contrast-medium administration in cases of normal unenhanced MRI in children does not provide additional information in 99.7%; in 0.3% only a pathological meningeal enhancement was revealed after application

of contrast medium. The results of our study argue against contrast-medium administration as a matter of routine in MR brain scanning. This provides evidence that gadolinium-based contrast-enhanced MR should be reserved for further characterization of equivocal lesions that were detected in the non-contrast scan and in selected individual cases of a tumor or infection for exclusion of meningeal involvement.

Compliance with ethical standards

Conflicts of interest None

References

1. Kanal E (2016) Gadolinium based contrast agents (GBCA): safety overview after 3 decades of clinical experience. *Magn Reson Imaging* 34:1341–1345
2. Collidge TA, Thomson PC, Mark PB et al (2007) Gadolinium-enhanced MR imaging and nephrogenic systemic fibrosis: retrospective study of a renal replacement therapy cohort. *Radiology* 245:168–175
3. Todd DJ, Kay J (2016) Gadolinium-induced fibrosis. *Annu Rev Med* 67:273–291
4. Todd DJ, Kagan A, Chibnik LB et al (2007) Cutaneous changes of nephrogenic systemic fibrosis: predictor of early mortality and association with gadolinium exposure. *Arthritis Rheum* 56:3433–3441
5. Grobner T (2006) Gadolinium – a specific trigger for the development of nephrogenic fibrosing dermopathy and nephrogenic systemic fibrosis? *Nephrol Dial Transplant* 21:1104–1108
6. Marckmann P, Skov L, Rossen K et al (2006) Nephrogenic systemic fibrosis: suspected causative role of gadodiamide used for contrast-enhanced magnetic resonance imaging. *J Am Soc Nephrol* 17:2359–2362
7. Quattrocchi CC, Mallio CA, Errante Y et al (2015) Gadodiamide and dentate nucleus T1 hyperintensity in patients with meningioma evaluated by multiple follow-up contrast-enhanced magnetic resonance examinations with no systemic interval therapy. *Investig Radiol* 50:470–472
8. Radbruch A, Weberling LD, Kieslich PJ et al (2015) Gadolinium retention in the dentate nucleus and globus pallidus is dependent on the class of contrast agent. *Radiology* 275:783–791
9. Kanda T, Osawa M, Oba H et al (2015) High signal intensity in dentate nucleus on unenhanced T1-weighted MR images: association with linear versus macrocyclic gadolinium chelate administration. *Radiology* 275:803–809
10. Murata N, Gonzalez-Cuyar LF, Murata K et al (2016) Macrocyclic and other non-group 1 gadolinium contrast agents deposit low levels of gadolinium in brain and bone tissue: preliminary results from 9 patients with normal renal function. *Investig Radiol* 51:447–453
11. White GW, Gibby WA, Tweedle MF (2006) Comparison of Gd(DTPA-BMA) (Omniscan) versus Gd(HP-DO3A) (ProHance) relative to gadolinium retention in human bone tissue by inductively coupled plasma mass spectroscopy. *Investig Radiol* 41:272–278
12. Weberling LD, Kieslich PJ, Kickingereder P et al (2015) Increased signal intensity in the dentate nucleus on unenhanced T1-weighted images after gadobenate dimeglumine administration. *Investig Radiol* 50:743–748
13. Zhang Y, Cao Y, Shih GL et al (2017) Extent of signal hyperintensity on unenhanced T1-weighted brain MR images after more than 35 administrations of linear gadolinium-based contrast agents. *Radiology* 282:516–525

14. Miller JH, Hu HH, Pokorney A et al (2015) MRI brain signal intensity changes of a child during the course of 35 gadolinium contrast examinations. *Pediatrics* 136:e1637–e1640
15. Roberts DR, Holden KR (2016) Progressive increase of T1 signal intensity in the dentate nucleus and globus pallidus on unenhanced T1-weighted MR images in the pediatric brain exposed to multiple doses of gadolinium contrast. *Brain Dev* 38:331–336
16. McDonald RJ, McDonald JS, Kallmes DF et al (2015) Intracranial gadolinium deposition after contrast-enhanced MR imaging. *Radiology* 275:772–782
17. Flood TF, Stence NV, Maloney JA et al (2017) Pediatric brain: repeated exposure to linear gadolinium-based contrast material is associated with increased signal intensity at unenhanced T1-weighted MR imaging. *Radiology* 282:222–228
18. Roberts DR, Chatterjee AR, Yazdani M et al (2016) Pediatric patients demonstrate progressive T1-weighted hyperintensity in the dentate nucleus following multiple doses of gadolinium-based contrast agent. *AJNR Am J Neuroradiol* 37:2340–2347
19. Hu HH, Pokorney A, Towbin RB, Miller JH (2016) Increased signal intensities in the dentate nucleus and globus pallidus on unenhanced T1-weighted images: evidence in children undergoing multiple gadolinium MRI exams. *Pediatr Radiol* 46:1590–1598
20. Elster AD, Rieser GD (1989) Gd-DTPA-enhanced cranial MR imaging in children: initial clinical experience and recommendations for its use. *AJR Am J Roentgenol* 153:1265–1268
21. Baierl P, Muhlsteffen A, Hausteiner J et al (1990) Comparison of plain and Gd-DTPA-enhanced MR-imaging in children. *Pediatr Radiol* 20:515–519
22. Eldevik OP, Brunberg JA (1994) Gadopentetate dimeglumine-enhanced MR of the brain: clinical utility and safety in patients younger than two years of age. *AJNR Am J Neuroradiol* 15: 1001–1008
23. Petrou M, Foerster B, Maly PV et al (2007) Added utility of gadolinium in the magnetic resonance imaging (MRI) workup of seizures in children younger than 2 years. *J Child Neurol* 22:200–203
24. Foerster BR, Ksar J, Petrou M et al (2006) Value of gadolinium in brain MRI examinations for developmental delay. *Pediatr Neurol* 35:126–130
25. Gutierrez JE, Rosenberg M, Seemann J et al (2015) Safety and efficacy of gadobutrol for contrast-enhanced magnetic resonance imaging of the central nervous system: results from a multicenter, double-blind, randomized, comparator study. *Magn Reson Insights* 8:1–10

3. Zusammenfassung

Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades

Dr. med.

Brauchen wir gadoliniumhaltiges Kontrastmittel in der Hirn-MRT-Diagnostik bei Kindern?

eingereicht von: Dennis Dünger

angefertigt an: Universität Leipzig, Medizinische Fakultät
Abteilung für Kinderradiologie

betreut von: Dr. med. Ina Sorge
Prof. Dr. med. Franz Wolfgang Hirsch

Einreichung: April 2019

Diese Studie beschäftigt sich mit der Frage, wie häufig und in welchen Fällen ein diagnostischer Zugewinn durch die generelle Gabe von Gadolinium (Gd) bei Kindern eintritt, wenn in der initialen nativen Hirn-Magnetresonanztomografie (MRT)-Untersuchung kein pathologischer Befund zu finden war. Hierzu liegen bisher keine belastbaren statistischen Daten vor. Dazu wurden 6.683 Kontrastmittel (KM)-MRT-Untersuchungen retrospektiv nochmals ausgewertet und daraufhin untersucht, ob die KM-Gabe zusätzliche relevante Informationen liefern konnte.

Für diese Studie wurden sämtliche Hirn-MRT-Untersuchungen in der Abteilung Kinderradiologie des Universitätsklinikums Leipzig von Juli 2005 bis Oktober 2016 ein zweites Mal ausgewertet. Eingeschlossen waren alle Hirn-MRT-Untersuchungen von Kindern und Jugendlichen im Alter von 0 bis einschließlich 16 Jahren. Es wurden

zunächst alle Untersuchungen erfasst und anschließend separat diejenigen mit KM-Applikation ausgewertet. Zur Auswertung kamen 10.474 kraniale MRT-Untersuchungen. Aufgrund der Ausschlusskriterien wurden von diesen Patienten schließlich 6.683 der KM-MRT-Untersuchungen des Kopfes in die Auswertung einbezogen.

Die Indikationen für die Bildgebung wurden in 12 Gruppen kategorisiert:

- Kopfschmerzen
- Psychiatrie
- Neurologie
- Epileptische Anfälle
- Tumor und Verdacht auf Raumforderung
- Entwicklungsretardierung/-störung beziehungsweise Fehlbildung
- Hirndruck
- Infektion/Entzündung
- Verlaufskontrolle Gefäßmalformation
- Erweiterung der Liquorräume
- Trauma
- Sonstiges

Für jede einzelne MRT-Untersuchung wurde ermittelt, ob bereits vor der KM-Gabe auffällige Befunde im MRT sichtbar waren. Anschließend wurde festgelegt, ob sich durch die KM-Gabe zusätzliche Informationen und zusätzlich relevante Informationen ergaben.

Abschließend wurden die prozentualen Anteile der Zusatzinformationen berechnet und der negative prädiktive Wert (NPV) ermittelt. Der NPV kann eine Aussage darüber treffen, inwieweit bei einem nativ unauffälligen MRT-Befund eine KM-Gabe keinen diagnostischen Mehrwert bringt.

MRT nativ unauffällig

3.003 von 6.683 (44,9 %) unserer Patienten zeigten in den nativen MRT-Aufnahmen keine Auffälligkeiten. Lediglich bei 8 von diesen Untersuchungen (0,3 %) konnte durch Gd-Applikation ein relevanter Zusatzbefund verzeichnet werden. Hierbei handelte es sich in allen 8 Fällen ausschließlich um ein meningeales Enhancement. Wir konnten daraus einen NPV von 0,997 bestimmen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, eine relevante meningeale KM-Aufnahme zu übersehen, liegt bei einem nativ unauffälligen MRT bei ca. 3 Promille. Um zu eruieren, ob die in unserer Studie bei knapp 0,3 % der Patienten gefundene meningeale KM-Aufnahme einen Einfluss auf Diagnosestellung und Therapie hatte, haben wir jeden einzelnen Fall genauer betrachtet:

In 4 Fällen lag primär ein infektiöses Geschehen vor (Meningitis durch *Escherichia coli*, *Haemophilus influenzae*, Pneumokokken, Neuroborreliose). Das meningeale Enhancement ist in diesen Fällen zum einen durch die Entzündung, zum anderen durch die zuvor stattgehabte Lumbalpunktion zu interpretieren und war nicht überraschend.

Bei einem Patienten waren die Klinik und die Anamnese unspezifisch (Kopfschmerzen, Schwindel, Erbrechen). Nur in diesem einen Fall war das meningeale Enhancement in der MRT-Untersuchung ein Schlüssel für das weitere Vorgehen (Lumbalpunktion) und schließlich für die Diagnosestellung (Meningitis durch Enteroviren).

Bei einem Patienten erfolgte das MRT nach einem Polytrauma (Verkehrsunfall). Aufgrund einer Felsenbeinfraktur mit parallel auftretendem Fieber diente das MRT hier zum Ausschluss einer intrakraniellen Entzündung und war daher angezeigt. Das meningeale Enhancement lässt sich hier als eine meningeale Irritation interpretieren.

Ein Patient litt an einer neoplastischen Grunderkrankung (Burkitt-Lymphom). Hier war vor der MRT-Untersuchung eine Lumbalpunktion erfolgt, so dass das Enhancement als Folge dieser interpretiert wurde. Bei der Frage nach einer Zentralnervensystem (ZNS)-Beteiligung einer Neoplasie ist jedoch eine KM-Gabe unabhängig vom nativen Befund indiziert.

Ein Patient bekam ein KM-MRT aufgrund von Kopfschmerzen, Schwindel und Übelkeit zum Ausschluss einer zentralen Ätiologie. Das Enhancement wurde auch hier als Verdacht auf ein entzündliches Geschehen im Rahmen einer Meningitis interpretiert,

die sich aber klinisch nach Lumbalpunktion nicht bestätigte, und somit unklar blieb. Im Langzeit-Follow up sahen wir keine meningeale Pathologie. Das meningeale KM-Enhancement hatte damit keinen wegweisenden Einfluss auf die Diagnose.

MRT nativ auffällig

3.680 (55,1 %) unserer Patienten zeigten bereits in der nativen Untersuchung Auffälligkeiten. In diesen Fällen diente das KM zur näheren Charakterisierung der schon nativ als auffällig beschriebenen Strukturen.

In unserer Studie zeigten sich in 8,1 % der Fälle nach KM zusätzliche Befunde außerhalb der nativ auffälligen Regionen. Bei drei Viertel dieser Patienten lag eine Fragestellung bezüglich einer Neoplasie vor. Für die Tumordiagnostik ist die Überlegenheit von KM-gestützten Aufnahmen gegenüber nativen Sequenzen bekannt. Jedoch auch ein fehlendes Enhancement von nativ auffälligen Strukturen stellt eine wichtige diagnostische Zusatzinformation dar. In unserer Studie blieben die als nativ auffällig bewerteten Läsionen bei 68,2 % der Patienten ohne eine KM-Aufnahme, bei 31,8 % fiel dagegen ein Enhancement nach KM-Gabe genau in den zuvor nativ aufgefallenen Läsionen auf.

Schlussfolgerung

Bei pädiatrischen MRT-Untersuchungen des Gehirns, die schon vor KM-Gabe Auffälligkeiten zeigen, sollte die Indikation zur KM-Gabe in jedem Einzelfall kritisch geprüft werden. Wir fanden allerdings in immerhin 8,1 % dieser Fälle wegweisende Zusatzinformation durch die kontrastverstärkte MRT gegenüber der Nativuntersuchung, so dass sich hieraus auch aus unseren Daten weiterhin eine klare Indikation für die Applikation von KM ergibt.

Unsere Studie zeigte aber auch, dass eine KM-Gabe bei einem nativ unauffälligen MRT bezüglich der Detektion von weiteren Hirnveränderungen in 99,7 % keine zusätzlichen Informationen bringt. Bei unseren Patienten fanden wir in nur knapp 0,3 % ein meningeales Enhancement, das zuvor naturgemäß nicht erkennbar war. Allerdings führten diese Befunde nur in einem einzigen Fall zu einer richtungsweisenden

Diagnose mit Änderung der therapeutischen Strategie (0,03 % der Kinder). Stellt man diesem Ergebnis die Nachteile einer routinemäßigen Gd-Applikation, wie zusätzlich entstehende Kosten und Untersuchungszeit sowie potenziell unerwünschte Effekte durch Gd einschließlich der klinisch noch nicht zu bewertenden Ablagerungen im Gehirn gegenüber, dann ergibt sich daraus eine zahlenmäßig begründete Evidenz, zukünftig routinemäßig auf die KM-Gabe zu verzichten, sofern die native Untersuchung einen vollkommen unauffälligen Befund ergibt. In Einzelfällen kann von dieser Empfehlung abgewichen werden, wenn klinisch der Verdacht auf eine ZNS-Infektion besteht, oder wenn bei unklarer Symptomatik ein spreitender meningealer Tumor mit KM-Gabe ausgeschlossen werden soll.

4. Literatur

- Abraham JL, Thakral C: Tissue distribution and kinetics of gadolinium and nephrogenic systemic fibrosis. *European journal of radiology* 2008;66:200–207 DOI: 10.1016/j.ejrad.2008.01.026.
- Abujudeh HH, Rolls H, Kaewlai R, et al.: Retrospective assessment of prevalence of nephrogenic systemic fibrosis (NSF) after implementation of a new guideline for the use of gadobenate dimeglumine as a sole contrast agent for magnetic resonance examination in renally impaired patients. *Journal of magnetic resonance imaging : JMRI* 2009;30:1335–1340 DOI: 10.1002/jmri.21976.
- Agarwal R, Brunelli SM, Williams K, et al.: Gadolinium-based contrast agents and nephrogenic systemic fibrosis: a systematic review and meta-analysis. *Nephrology, dialysis, transplantation : official publication of the European Dialysis and Transplant Association - European Renal Association* 2009;24:856–863 DOI: 10.1093/ndt/gfn593.
- Bellin MF, Vasile M, Morel-Precetti S: Currently used non-specific extracellular MR contrast media. *European radiology* 2003;13:2688–2698 DOI: 10.1007/s00330-003-1912-x.
- Bhagavathula N, DaSilva M, Aslam MN, et al.: Regulation of collagen turnover in human skin fibroblasts exposed to a gadolinium-based contrast agent. *Investigative radiology* 2009;44:433–439 DOI: 10.1097/RLI.0b013e3181a4d7e9.
- Broome DR, Girguis MS, Baron PW, et al.: Gadodiamide-Associated Nephrogenic Systemic Fibrosis: Why Radiologists Should Be Concerned. *American Journal of Roentgenology* 2007;188:586–592 DOI: 10.2214/AJR.06.1094.
- Burke LMB, Ramalho M, AlObaidy M, et al.: Self-reported gadolinium toxicity: A survey of patients with chronic symptoms. *Magnetic resonance imaging* 2016;34:1078–1080 DOI: 10.1016/j.mri.2016.05.005.
- Cacheris WP, Quay SC, Rocklage SM: The relationship between thermodynamics and the toxicity of gadolinium complexes. *Magnetic resonance imaging* 1990;8:467–481 DOI: 10.1016/0730-725X(90)90055-7.
- Cassis TB, Jackson JM, Sonnier GB, et al.: Nephrogenic fibrosing dermopathy in a patient with acute renal failure never requiring dialysis. *International journal of dermatology* 2006;45:56–59 DOI: 10.1111/j.1365-4632.2005.02701.x.
- Chandra T, Mohan S: Role of Contrast in MR Imaging. *Topics in magnetic resonance imaging : TMRI* 2016;25:151–156 DOI: 10.1097/RMR.0000000000000094.
- Collidge TA, Thomson PC, Mark PB, et al.: Gadolinium-enhanced MR imaging and nephrogenic systemic fibrosis: retrospective study of a renal replacement therapy cohort. *Radiology* 2007;245:168–175 DOI: 10.1148/radiol.2451070353.
- Darrah TH, Prutsman-Pfeiffer JJ, Poreda RJ, et al.: Incorporation of excess gadolinium into human bone from medical contrast agents. *Metallomics : integrated bio-metal science* 2009;1:479–488 DOI: 10.1039/b905145g.
- Del Galdo F, Wermuth PJ, Addya S, et al.: NFκB activation and stimulation of chemokine production in normal human macrophages by the gadolinium-based magnetic resonance contrast agent Omniscan: possible role in the pathogenesis of

- nephrogenic systemic fibrosis. *Annals of the rheumatic diseases* 2010;69:2024–2033 DOI: 10.1136/ard.2010.134858.
- Edward M, Quinn JA, Mukherjee S, et al.: Gadodiamide contrast agent 'activates' fibroblasts: a possible cause of nephrogenic systemic fibrosis. *The Journal of pathology* 2008;214:584–593 DOI: 10.1002/path.2311.
- Engelhorn T, Doerfler A: High-molar contrast agents for CNS application. *Imaging Decisions MRI* 2008;11:26–32 DOI: 10.1111/j.1617-0830.2007.00107.x.
- Flood TF, Stence NV, Maloney JA, et al.: Pediatric Brain: Repeated Exposure to Linear Gadolinium-based Contrast Material Is Associated with Increased Signal Intensity at Unenhanced T1-weighted MR Imaging. *Radiology* 2017;282:222–228 DOI: 10.1148/radiol.2016160356.
- Forghani R: Adverse Effects of Gadolinium-Based Contrast Agents: Changes in Practice Patterns. *Topics in magnetic resonance imaging : TMRI* 2016;25:163–169 DOI: 10.1097/RMR.0000000000000095.
- Franano F, Edwards W, Welch MJ, et al.: Biodistribution and metabolism of targeted and nontargeted protein-chelate-gadolinium complexes: Evidence for gadolinium dissociation in vitro and in vivo. *Magnetic resonance imaging* 1995;13:201–214 DOI: 10.1016/0730-725X(94)00100-H.
- George SJ, Webb SM, Abraham JL, et al.: Synchrotron X-ray analyses demonstrate phosphate-bound gadolinium in skin in nephrogenic systemic fibrosis. *The British journal of dermatology* 2010;163:1077–1081 DOI: 10.1111/j.1365-2133.2010.09918.x.
- Girardi M, Kay J, Elston DM, et al.: Nephrogenic systemic fibrosis: clinicopathological definition and workup recommendations. *Journal of the American Academy of Dermatology* 2011;65:1095-1106.e7 DOI: 10.1016/j.jaad.2010.08.041.
- Grobner T: Gadolinium--a specific trigger for the development of nephrogenic fibrosing dermopathy and nephrogenic systemic fibrosis? *Nephrology, dialysis, transplantation : official publication of the European Dialysis and Transplant Association - European Renal Association* 2006;21:1104–1108 DOI: 10.1093/ndt/gfk062.
- Hesselink JR, Healy ME, Press GA, et al.: Benefits of Gd-DTPA for MR Imaging of Intracranial Abnormalities. *Journal of Computer Assisted Tomography* 1988;12:266–274 DOI: 10.1097/00004728-198803000-00015.
- Hill AB: The environment and disease: association or causation? 1965. *Journal of the Royal Society of Medicine* 2015;108:32–37 DOI: 10.1177/0141076814562718.
- Hu HH, Pokorney A, Towbin RB, et al.: Increased signal intensities in the dentate nucleus and globus pallidus on unenhanced T1-weighted images: evidence in children undergoing multiple gadolinium MRI exams. *Pediatric radiology* 2016;46:1590–1598 DOI: 10.1007/s00247-016-3646-3.
- Idée J-M, Port M, Raynal I, et al.: Clinical and biological consequences of transmetalation induced by contrast agents for magnetic resonance imaging: a review. *Fundamental & clinical pharmacology* 2006;20:563–576 DOI: 10.1111/j.1472-8206.2006.00447.x.

- Itoh N, Kawakita M: Characterization of Gd³⁺ and Tb³⁺ Binding Sites on Ca²⁺, Mg²⁺-Adenosine Triphosphatase of Sarcoplasmic Reticulum¹. *The Journal of Biochemistry* 1984;95:661–669 DOI: 10.1093/oxfordjournals.jbchem.a134655.
- Jain SM, Wesson S, Hassanein A, et al.: Nephrogenic fibrosing dermopathy in pediatric patients. *Pediatric nephrology (Berlin, Germany)* 2004;19:467–470 DOI: 10.1007/s00467-003-1380-1.
- Jiménez SA, Artlett CM, Sandorfi N, et al.: Dialysis-associated systemic fibrosis (nephrogenic fibrosing dermopathy): study of inflammatory cells and transforming growth factor beta1 expression in affected skin. *Arthritis and rheumatism* 2004;50:2660–2666 DOI: 10.1002/art.20362.
- Jung J-W, Kang H-R, Kim M-H, et al.: Immediate hypersensitivity reaction to gadolinium-based MR contrast media. *Radiology* 2012;264:414–422 DOI: 10.1148/radiol.12112025.
- Kanal E: Gadolinium based contrast agents (GBCA): Safety overview after 3 decades of clinical experience. *Magnetic resonance imaging* 2016;34:1341–1345 DOI: 10.1016/j.mri.2016.08.017.
- Kanda T, Nakai Y, Oba H, et al.: Gadolinium deposition in the brain. *Magnetic resonance imaging* 2016;34:1346–1350 DOI: 10.1016/j.mri.2016.08.024.
- Marckmann P, Skov L, Rossen K, et al.: Case-control study of gadodiamide-related nephrogenic systemic fibrosis. *Nephrology, dialysis, transplantation : official publication of the European Dialysis and Transplant Association - European Renal Association* 2007;22:3174–3178 DOI: 10.1093/ndt/gfm261.
- Martin DR, Krishnamoorthy SK, Kalb B, et al.: Decreased incidence of NSF in patients on dialysis after changing gadolinium contrast-enhanced MRI protocols. *Journal of magnetic resonance imaging : JMRI* 2010;31:440–446 DOI: 10.1002/jmri.22024.
- Maximova N, Gregori M, Zennaro F, et al.: Hepatic Gadolinium Deposition and Reversibility after Contrast Agent-enhanced MR Imaging of Pediatric Hematopoietic Stem Cell Transplant Recipients. *Radiology* 2016;281:418–426 DOI: 10.1148/radiol.2016152846.
- McDonald RJ, McDonald JS, Kallmes DF, et al.: Intracranial Gadolinium Deposition after Contrast-enhanced MR Imaging. *Radiology* 2015;275:772–782 DOI: 10.1148/radiol.15150025.
- Miller JH, Hu HH, Pokorney A, et al.: MRI Brain Signal Intensity Changes of a Child During the Course of 35 Gadolinium Contrast Examinations. *Pediatrics* 2015;136:e1637-40 DOI: 10.1542/peds.2015-2222.
- Murata N, Gonzalez-Cuyar LF, Murata K, et al.: Macrocyclic and Other Non-Group 1 Gadolinium Contrast Agents Deposit Low Levels of Gadolinium in Brain and Bone Tissue: Preliminary Results From 9 Patients With Normal Renal Function. *Investigative radiology* 2016;51:447–453 DOI: 10.1097/RLI.0000000000000252.
- Murphy KJ, Brunberg JA, Cohan RH: Adverse reactions to gadolinium contrast media: a review of 36 cases. *AJR. American journal of roentgenology* 1996;167:847–849 DOI: 10.2214/ajr.167.4.8819369.

- Nardone B, Saddleton E, Laumann AE, et al.: Pediatric nephrogenic systemic fibrosis is rarely reported: a RADAR report. *Pediatric radiology* 2014;44:173–180 DOI: 10.1007/s00247-013-2795-x.
- Perez-Rodriguez J, Lai S, Ehst BD, et al.: Nephrogenic systemic fibrosis: incidence, associations, and effect of risk factor assessment--report of 33 cases. *Radiology* 2009;250:371–377 DOI: 10.1148/radiol.2502080498.
- Port M, Idee J-M, Medina C, et al.: Efficiency, thermodynamic and kinetic stability of marketed gadolinium chelates and their possible clinical consequences: a critical review. *Biometals : an international journal on the role of metal ions in biology, biochemistry, and medicine* 2008;21:469–490 DOI: 10.1007/s10534-008-9135-x.
- Prince MR, Zhang H, Morris M, et al.: Incidence of nephrogenic systemic fibrosis at two large medical centers. *Radiology* 2008;248:807–816 DOI: 10.1148/radiol.2483071863.
- Prince MR, Zhang H, Zou Z, et al.: Incidence of immediate gadolinium contrast media reactions. *AJR. American journal of roentgenology* 2011;196:W138-43 DOI: 10.2214/AJR.10.4885.
- Ramalho J, Ramalho M, Jay M, et al.: Gadolinium toxicity and treatment. *Magnetic resonance imaging* 2016a;34:1394–1398 DOI: 10.1016/j.mri.2016.09.005.
- Ramalho J, Semelka RC, Ramalho M, et al.: Gadolinium-Based Contrast Agent Accumulation and Toxicity: An Update. *AJNR. American journal of neuroradiology* 2016b;37:1192–1198 DOI: 10.3174/ajnr.A4615.
- Roberts DR, Chatterjee AR, Yazdani M, et al.: Pediatric Patients Demonstrate Progressive T1-Weighted Hyperintensity in the Dentate Nucleus following Multiple Doses of Gadolinium-Based Contrast Agent. *AJNR. American journal of neuroradiology* 2016a;37:2340–2347 DOI: 10.3174/ajnr.A4891.
- Roberts DR, Holden KR: Progressive increase of T1 signal intensity in the dentate nucleus and globus pallidus on unenhanced T1-weighted MR images in the pediatric brain exposed to multiple doses of gadolinium contrast. *Brain & development* 2016;38:331–336 DOI: 10.1016/j.braindev.2015.08.009.
- Roberts DR, Lindhorst SM, Welsh CT, et al.: High Levels of Gadolinium Deposition in the Skin of a Patient With Normal Renal Function. *Investigative radiology* 2016b;51:280–289 DOI: 10.1097/RLI.0000000000000266.
- Rogosnitzky M, Branch S: Gadolinium-based contrast agent toxicity: a review of known and proposed mechanisms. *Biometals : an international journal on the role of metal ions in biology, biochemistry, and medicine* 2016;29:365–376 DOI: 10.1007/s10534-016-9931-7.
- Runge VM: Safety of approved MR contrast media for intravenous injection. *J. Magn. Reson. Imaging* 2000;12:205–213 DOI: 10.1002/1522-2586(200008)12:2<205::AID-JMRI1>3.0.CO;2-P.
- Sadowski EA, Bennett LK, Chan MR, et al.: Nephrogenic systemic fibrosis: risk factors and incidence estimation. *Radiology* 2007;243:148–157 DOI: 10.1148/radiol.2431062144.
- Schmidt-Lauber C, Bossaller L, Abujudeh HH, et al.: Gadolinium-based compounds induce NLRP3-dependent IL-1 β production and peritoneal inflammation. *Annals of*

- the rheumatic diseases 2015;74:2062–2069 DOI: 10.1136/annrheumdis-2013-204900.
- Scott LJ: Gadobutrol: a review of its use for contrast-enhanced magnetic resonance imaging in adults and children. *Clinical drug investigation* 2013;33:303–314 DOI: 10.1007/s40261-013-0066-0.
- Swaminathan S, High WA, Ranville J, et al.: Cardiac and vascular metal deposition with high mortality in nephrogenic systemic fibrosis. *Kidney international* 2008;73:1413–1418 DOI: 10.1038/ki.2008.76.
- Ting WW, Stone MS, Madison KC, et al.: Nephrogenic fibrosing dermopathy with systemic involvement. *Archives of dermatology* 2003;139:903–906 DOI: 10.1001/archderm.139.7.903.
- Todd DJ, Kagan A, Chibnik LB, et al.: Cutaneous changes of nephrogenic systemic fibrosis: predictor of early mortality and association with gadolinium exposure. *Arthritis and rheumatism* 2007;56:3433–3441 DOI: 10.1002/art.22925.
- Todd DJ, Kay J: Gadolinium-Induced Fibrosis. *Annual review of medicine* 2016;67:273–291 DOI: 10.1146/annurev-med-063014-124936.
- Wermuth PJ, Del Galdo F, Jiménez SA: Induction of the expression of profibrotic cytokines and growth factors in normal human peripheral blood monocytes by gadolinium contrast agents. *Arthritis and rheumatism* 2009;60:1508–1518 DOI: 10.1002/art.24471.
- Wermuth PJ, Jimenez SA: Induction of a type I interferon signature in normal human monocytes by gadolinium-based contrast agents: comparison of linear and macrocyclic agents. *Clinical and experimental immunology* 2014;175:113–125 DOI: 10.1111/cei.12211.
- White GW, Gibby WA, Tweedle MF: Comparison of Gd(DTPA-BMA) (Omniscan) versus Gd(HP-DO3A) (ProHance) relative to gadolinium retention in human bone tissue by inductively coupled plasma mass spectroscopy. *Investigative radiology* 2006;41:272–278 DOI: 10.1097/01.rli.0000186569.32408.95.

5. Erklärung über die eigenständige Abfassung der Arbeit

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und ohne unzulässige Hilfe oder Benutzung anderer als der angegebenen Hilfsmittel angefertigt habe. Ich versichere, dass Dritte von mir weder unmittelbar noch mittelbar eine Vergütung oder geldwerte Leistungen für Arbeiten erhalten haben, die im Zusammenhang mit dem Inhalt der vorgelegten Dissertation stehen, und dass die vorgelegte Arbeit weder im Inland noch im Ausland in gleicher oder ähnlicher Form einer anderen Prüfungsbehörde zum Zweck einer Promotion oder eines anderen Prüfungsverfahrens vorgelegt wurde. Alles aus anderen Quellen und von anderen Personen übernommene Material, das in der Arbeit verwendet wurde oder auf das direkt Bezug genommen wird, wurde als solches kenntlich gemacht. Insbesondere wurden alle Personen genannt, die direkt an der Entstehung der vorliegenden Arbeit beteiligt waren. Die aktuellen gesetzlichen Vorgaben in Bezug auf die Zulassung der klinischen Studien, die Bestimmungen des Tierschutzgesetzes, die Bestimmungen des Gentechnikgesetzes und die allgemeinen Datenschutzbestimmungen wurden eingehalten. Ich versichere, dass ich die Regelungen der Satzung der Universität Leipzig zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis kenne und eingehalten habe.

.....

Datum

.....

Unterschrift

6. Spezifizierung des eigenen wissenschaftlichen Beitrages

Im Folgenden lege ich meinen Beitrag der Publikation

„Do we need gadolinium-based contrast medium for brain magnetic resonance imaging in children?“

dar.

Konzeption der Studie:

- Mitarbeit im geringen Maße

Erarbeitung, Analyse und Interpretation der Daten:

- Zum Großteil alleinige Durchführung

Formulierung des Manuskripts:

- Alleinige Durchführung der Literaturrecherche
- Wesentlicher Anteil an der Formulierung des Manuskripts und Zusammenführung der korrigierten Versionen der anderen Autoren
- Wesentlicher Anteil an der Korrespondenz mit dem veröffentlichenden Journal und der Einreichung

.....
Datum

26. 3. 19

.....
Datum

.....
Dr. med. Matthias Krause

.....
Dr. med. Daniel Gräfe

.....
Datum

.....
Prof. Dr. med. Andreas Merckenschlager

25.03.19

Datum

Dr. med. Christian Roth

25.3.19

Datum

Dr. med. Ina Sorge

Leipzig, 18.03.2018

Dennis Dünger